

**פרק 2**  
**מאפיינים בריאותיים של בני 65+**  
**ודפוס שימוש בשירותי בריאות נבחרים**



## — לקט נתונים —

### ❖ תוחלת החיים, 2016

	גברים	נשים
בלידה	80.7	84.2
בגיל 65	19.1	21.4

### ❖ בני 65+ התופסים את מצב בריאותם כ"טוב" או "טוב מאד", 2016, אחוזים

	סה"כ	גברים	נשים
טוב	41.7	43.5	40.3
טוב מאוד	14.0	16.7	11.8

### ❖ אומדן בני 65+ שלהם קושי רב בביצוע פעולות שונות, 2016, אחוזים

	ללכת או לעלות במדרגות	לבצע להתלבש או פעולות להרחץ משק בית
	31.0	13.6
	27.2	27.2

### ❖ בני 65+ המדווחים על קבלת חיסון נגד שפעת, 2010, 57.0%

### ❖ ביקורים אצל רופא משפחה של בני 65+ במהלך שנה, 2009, ממוצע לנפש

	סה"כ	גברים	נשים
	11.2	10.8	11.6

### ❖ אשפוזים של בני 65+ במחלקות כלליות, 2016

שיעורים ל-1,000 נפש

418

### ❖ סיבות פטירה עיקריות של בני 65+, 2015

22.9%	שאתות ממאירות
16.0%	מחלות לב
6.3%	מחלות של כלי דם במוח
6.1%	סוכרת

## 2. מאפיינים בריאותיים של בני 65+ ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



### מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של בני 65+ בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של בני 65+ אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד להתנהגות בריאותית ובשמירה על בריאותם.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של בני 65+ ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשה באיכות חייו של האדם. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של בני 65+ ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, סגנון חיים, מחלות, מוגבלות ותמותה, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. עוד מובאים נתונים על דפוסי השימוש של בני 65+ בשירותי הבריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

## ממצאים עיקריים

- ◆ **תוחלת החיים בלידה** הגיעה בשנת 2016 ל-84 שנים לנשים ול-81 שנים לגברים. תוחלת החיים של יהודים ואחרים גבוהה מזו של הערבים: בשנת 2016 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 4 שנים לגברים ו-3 שנים לנשים (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** בשנים 2012-2016 היא 21 שנים לנשים ו-19 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 86 בממוצע, וגבר – עד גיל 84. תוחלת החיים בגיל 65 של יהודים גבוהה מזו של ערבים (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 13 שנים ולגברים 12 שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת החיים של גברים בני 75 ב-3.3 שנים ושל נשים בנות 75 ב-3.9 שנים. גברים ונשים שהגיעו לגיל 95 צפויים לחיות עוד 3.3 שנים בממוצע (לוח 2.3).
- ◆ ב-2015 עמד **שיעור הפטירה** המתוקן ל-1,000 בני 65+ על 45 בקרב הגברים ועל 34 בקרב הנשים. שיעור הפטירה המתוקן ל-1,000 בני 65+ בקרב הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים: 56 בקרב הגברים ו-45 בקרב הנשים (לוח 2.4).
- בשנת 2015 שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי ישראל היה 40, בקרב ילידי אסיה 39, בקרב ילידי אפריקה 36 ובקרב ילידי אירופה-אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) 48. שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי בריה"מ לשעבר הוא 42 (לוח 2.5).
- שישים ושישה אחוזים מבני 65+ **נפטרו בבית חולים** בשנת 2017, שיעור דומה לזה שבקרב בני 0-64 (65%) ובקרב כלל האוכלוסייה (65%). בקרב בני 65+ 68% מהגברים ו-64% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 61% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 71% מהנשים. יש לשים לב כי הנתונים אינם כוללים את כל בתי החולים למחלות ממושכות ולכן יתכן שהנתונים, במיוחד לגבי בני 65+, מוטים כלפי מטה (לוח 2.6).

- **סיבת הפטירה העיקרית**, הן בקרב בני 65+ והן בכלל האוכלוסייה, היא שאתות ממאירות. בקרב בני 65+ סיבות עיקריות נוספות הן מחלת לב איסכמית, מחלות של כלי דם במוח, מחלות זיהומיות וסוכרת (לוח 2.7).
- ב-2014 נפטרו 36,033 אנשים בגיל 65+, שהם 81% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. עם השנים חלקם של בני 65-74 בכלל הפטירות של בני 65+ הולך ופוחת. בשנת 2003 היה חלקם של בני 65-74 מתוך הפטירות של בני 65+ 23% לעומת 19% ב-2015 (לוח 2.9 ונתונים משנתונים קודמים).
- עם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב, לחץ-דם ומחלות כלי דם (יתר לחץ-דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, מחלות אחרות של מחזור הדם) בסיבות הפטירה: מ-19% בקרב בני 65-74 ל-30% בקרב בני 85+. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-38% בקרב בני 65-74 ל-14% בקרב בני 85+ (לוח 2.9א).
- ♦ בשנת 2013 נרשמו 53 **התאבדויות** של גברים בני 65 ומעלה ו-20 התאבדויות של נשים בנות 65 ומעלה. אחוז ההתאבדויות של בני 65+ מכלל ההתאבדויות באוכלוסייה ירד מ-31% ב-1981 ל-20% ב-2013 (לוח 2.10).
- ♦ על פי הסקר החברתי, בשנים 2014-2016 56% מבני 65 ומעלה מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד**, לעומת 84% בקרב בני 20 ומעלה. בקרב בני 65+, 60% מהגברים ו-52% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 14% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל-לא-טוב, לעומת 4% בקרב בני 20 ומעלה (לוח 2.11).
- ♦ על פי הסקר החברתי, בשנת 2010 47% מבני 65+ **עוסקים בפעילות גופנית**. 36% מבני 65+ עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע, 40% מהגברים ו-32% מהנשים. 38% מבני 65-74 עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע ו-33% מבני 75+. בקרב כלל האוכלוסייה, 31% עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע. מתוך בני 65+ העוסקים בפעילות גופנית, 86% עוסקים בפעילות גופנית מתונה ו-12% עוסקים בפעילות גופנית מאומצת. 28% עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק

השרירים. מבין בני 65+ שאינם עוסקים בפעילות גופנית 60% ציינו שהסיבה היא בעיה בריאותית או גופנית ו-12% ציינו שהסיבה היא חוסר חשיבות לפעילות הגופנית. רק 3% ציינו שהסיבה היא העדר תנאים מתאימים (לוח 2.12).

◆ **מדד מסת הגוף (BMI)** מחושב על-פי גובה ומשקל. ערכים שמעל 30 נחשבים להשמנת יתר. על פי הסקר החברתי של 2010 ל-16% בקרב כלל האוכלוסייה יש BMI של 30 ויותר. לעומת זאת, ל-23% מבני 65 ומעלה יש BMI של 30 ויותר (25% מבני 65-74 ו-20% מבני 75 ומעלה). 26% מהנשים סובלות מהשמנת יתר, לעומת 19% מהגברים. בקרב הערבים 27% סובלים מהשמנת יתר לעומת 22% בקרב יהודים ואחרים. אחוז הנשים הערביות הסובלות מהשמנת יתר גבוה במיוחד, 37% (לוח 2.13).

◆ על פי הסקר החברתי של 2010 12% מהקשישים **מעשנים** כיום, פעם בשבוע לפחות, לעומת 25% בכלל האוכלוסייה. אחוז המעשנים בקרב הגברים בני 65+, כפול מאחוז הנשים בנות 65+ המעשנות (16% לעומת 8%). 34% מבני 65+ עישנו בעבר והפסיקו. מבין המעשנים שהפסיקו, 25% עשו זאת בגיל 50-59 ו-26% בגיל 60 ומעלה (לוח 2.14).

◆ על פי הסקר החברתי, בשנת 2010 55% מבני 65 ומעלה מדווחים על **קושי כלשהו להירדם** או לישון במשך לילה שלם לעומת 39% בקרב כלל האוכלוסייה. 52% אחוזים מהגברים בני 65-74 מדווחים על קושי מסוג זה ו-60% מבני 75+. מבין אלה שדיווחו על בעיות שינה (בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה) 84% דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום בגלל בעיות שינה (לוח 2.15).

◆ על פי סקר בריאות 2009, 54% מבני 65+ דיווחו כי רופא אבחן אצלם יתר לחץ דם, 49% מהגברים ו-57% מהנשים. 11% בקרב כלל האוכלוסייה דיווחו על כך. 13% מבני 65+ דיווחו שרופא אבחן אצלם התקף לב או אוטם שריר הלב, 18% בקרב הגברים ו-9% בקרב הנשים (2% בקרב כלל האוכלוסייה). 23% מבני 65+ דיווחו כי רופא אבחן אצלם סוכרת (5% בקרב כלל האוכלוסייה). 12% דיווחו על בעיה כרונית במערכת העיכול, 9% בקרב הגברים ו-14% בקרב הנשים (3% בקרב כלל האוכלוסייה). 8% מבני 65+

דיווחו כי רופא אבחן אצלם דיכאון או חרדה, 5% בקרב הגברים ו-11% בקרב הנשים (3% בקרב כלל האוכלוסייה); (לוח 2.16).

- מקרב אלו שדיווחו כי רופא אבחן אצלם מחלות, רובם **נוטלים תרופות** על פי מרשם רופא בגלל מחלות אלו: יתר לחץ דם (96%), התקף לב, אוטם שריר הלב (88%), שבץ מוחי (75%), סוכרת (92%), אסתמה (85%), מחלת ריאות כרונית (71%), בעיה כרונית במערכת העיכול (82%), מחלה ממארת – סרטן (42%), דיכאון או חרדה (72%); (לוח 2.16).

♦ בשנת 2015 נרשמו 15,839 **מקרים חדשים של שאֵתות ממאירות** בקרב בני 65+, אשר מהווים 1,722 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים בכלל האוכלוסייה הוא 352 לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים בני 65+ גבוה יותר מאשר בקרב הנשים בנות 65+ (1,973 לעומת 1,524 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.17).

- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאֵתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים: 2,006 לעומת 1,628 לכל 100,000 נפש. גם שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,562 לעומת 1,078 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.18). בשנת 2015 שיעור המקרים החדשים בקרב גברים יהודים ילידי אירופה-אמריקה היה גבוה מאשר בקרב יהודים ילידי אסיה, אפריקה או ישראל. בקרב נשים יהודיות, שיעור המקרים החדשים בקרב ילידות ישראל וילידות אירופה-אמריקה (1,595 ו-1,800) גבוה מזה של ילידות אסיה וילידות אפריקה (1,359 ו-1,297 בהתאמה); (לוח 2.19).

♦ לפי נתוני הסקר החברתי<sup>1</sup>, בשנת 2016 אומדן בני 65+ הגרים בקהילה **ומוגבלים בביצוע** (מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע) פעולות הקשורות למשק הבית (כגון נקיון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית) עומד על 260 אלף איש והם מהווים 27% מבני 65+ הגרים בקהילה. שיעור

1 הנתונים על מוגבלות שפורסמו בשנתון 2012 היו מבוססים על סקר בריאות לאומי (2009).

המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 17% בקרב בני 65-74 לעומת 42% בקרב בני 75+. מספרם של בני 65+ המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב-296 אלף איש (31% מבני 65+ הגרים בקהילה). שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 65-74 עומד על 22% ובקרב בני 75+ על 45%. מספר בני 65+ המוגבלים בביצוע פעולות מתחום הטיפול האישי, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב-130 אלף איש והם מהווים 14% מבני 65+ הגרים בקהילה (7% בקרב בני 65-74 ו-23% בקרב בני 75+). 80 אלף איש מוגבלים בראייה ו-97 אלף איש בשמיעה בקרב בני 65+ (8% ו-10% בהתאמה). שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו גבוה בקרב הערבים לעומת היהודים ואחרים. למשל, 55% בקרב הערבים מוגבלים בביצוע פעולות הקשורות למשק הבית לעומת 25% בקרב יהודים ואחרים (לוח 2.20).

♦ בשנת 2016 נפגעו **בתאונות דרכים** 2,226 בני 65+. מתוכם, 78 נהרגו (3.5% מבני 65+ שנפגעו), 354 נפצעו קשה (16%) ו-1,794 נפצעו קל (81%). בהשוואה לנתוני 2015 עלה מספרם המוחלט של בני 65+ שנפגעו אך ירד אחוז ההרוגים מתוך הנפגעים. 35% מבני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 38% נהגו ברכב ו-22% נסעו ברכב (לוח 2.21 ונתונים משנתונים קודמים).

- שיעור בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2016 נמוך מזה שבקרב כלל האוכלוסייה (232 ו-260 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך **שיעור ההרוגים** בקרב בני 65+ גבוה מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה (8 ו-4 ל-100,000 נפש בהתאמה). שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב בני 65+ (לוח 2.22). שיעור בני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים ושיעור ההרוגים מתוכם היו בתהליך ירידה מאז שנות התשעים עד לשנת 2012. ב-2016 חלה ירידה בשיעור ההרוגים מתוך הנפגעים בני 65+ (לוח 2.23).

- **שיעור הנהגים בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בשנת 2016 הוא 48 ל-10,000 נהגים לעומת 54 בכלל האוכלוסייה. בסה"כ היו 2,215 נהגים בני 65+ מעורבים בתאונות מתוכן 48 תאונות קטלניות (כ-3% מהתאונות); (לוח 2.24).



- ◆ שלושים ואחד אחוזים מבני 65+ ביקרו אצל רופא משפחה (כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי – בקהילה) או התייעצו אתו בטלפון בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות 2009) לעומת 10% בקרב כלל האוכלוסייה. אצל רופא אורתופד ביקרו 3% מבני 65+ בשבועיים האחרונים ואצל קרדיולוג ביקרו 2% מבני 65+ בשבועיים האחרונים לפני הסקר. אחוז בני 65+ אשר ביקרו אצל רופאים גבוה מאשר האחוז בקרב כלל האוכלוסייה, למעט אצל רופא נשים (לוח 2.25).
- בני 65+ מבקרים בממוצע אצל רופא משפחה (כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי – בקהילה) כ-11 פעמים בשנה לעומת 3 פעמים בממוצע בשנה בקרב כלל האוכלוסייה. בממוצע, מבקרים בני 65+ 0.8 פעמים בשנה אצל רופא אורתופד, 0.6 פעמים בשנה אצל רופא עיניים ו-0.5 פעמים בשנה אצל רופא קרדיולוג (לוח 2.26).
- שלושים אחוזים מסך הביקורים (כולל ייעוץ טלפוני) אצל רופא משפחה (כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי – בקהילה) נעשים על ידי בני 65+. 43% מהביקורים אצל רופא פנימי במרפאות חירום או בבתי חולים נעשים על ידי בני 65+. 44% מהביקורים אצל רופא קרדיולוג, 42% מהביקורים אצל רופא אורולוג, 32% מהביקורים אצל רופא עיניים, 30% מהביקורים אצל רופא ריאות ו-29% מהביקורים אצל רופא נירולוג נעשים על ידי בני 65+ (לוח 2.27).
- ◆ כמעט כל בני 65+ עשו בדיקת דם בשנה האחרונה (96%) ובדיקת כולסטרול (95%). בקרב כלל האוכלוסייה (בני 20+) 80% עשו בדיקת דם ו-83% בדקו כולסטרול, בשנה האחרונה לפני הסקר. 44% מבני 65+ עשו בדיקת קולונוסקופייה אי פעם. בקרב כלל האוכלוסייה (בני 50+) 37% עשו את הבדיקה (לוח 2.28).
- ◆ לפי הסקר החברתי, בשנת 2010, 57% מבני 65+ קיבלו חיסון נגד שפעת, 60% מהגברים ו-55% מהנשים. עם העלייה בגיל עולה שיעור מקבלי החיסון: 53% בקרב בני 65-74 לעומת 62% בקרב בני 75+. בקרב כלל האוכלוסייה (בני 20+) 23% קיבלו חיסון נגד שפעת (לוח 2.29).

- ◆ לפי הסקר החברתי, 38% מבני 65+ עברו בדיקה או טיפול שיניים בשנה האחרונה ו-29% עברו ניקוי שיניים. שיעור מקבלי טיפול השיניים יורד עם הגיל: 42% מבני 65-74 עברו בדיקה או טיפול לעומת 33% מבני 75+. 50% מקרב כלל האוכלוסייה (20+) עברו בדיקה או טיפול שיניים בשנה האחרונה לפני הסקר (לוח 2.30).
- ◆ מתוך כלל הביקורים במחלקות לרפואה דחופה (חדרי מיון) בשנת 2016, 22% היו של בני 65+. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 424 בקרב בני 65-74; 702 בקרב בני 75-84; 1,049 בקרב בני 85+ לעומת 303 בקרב כלל האוכלוסייה. 22% מהביקורים של בני 65+ היו ביקורים חוזרים (ביקורים חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) לעומת 17% ביקורים חוזרים בקרב כלל האוכלוסייה (לוח 2.31).
- ◆ תשעה עשר אחוזים מבני 65+ דיווחו על אשפוז בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות 2009). שיעור האשפוזים עולה עם הגיל: 16% מבני 65-74 דיווחו על אשפוז; 22% מבני 75+, לעומת 6% בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוזים בקרב הערבים גבוה יותר ועמד על 24% לעומת שיעור האשפוזים בקרב קבוצת היהודים ואחרים (19%); (לוח 2.32).
- **שיעורי האשפוז של בני 65+ במחלקות האשפוז הכלליות גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה.** בשנת 2016 נרשמו 418 אשפוזים ל-1,000 בני 65+ במחלקות האשפוז הכלליות, לעומת 135 ל-1,000 בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-306 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-705 בגיל 85+). מאז שנת 2000 נמצאים שיעורי האשפוז של בני 65+ במגמת ירידה, בעיקר בקרב בני 65-74 (לוח 2.33).
- **בבחינת שיעור אשפוז בני 65+ מכלל האשפוזים נמצא, כי בשנת 2016, 35% מהאשפוזים היו של בני 65+ (המהווים כ-11% מכלל האוכלוסייה), ו-20% מהאשפוזים היו של בני 75+ (המהווים כ-5% מכלל האוכלוסייה); (לוח 2.34).** חלקם של בני 65+ מתוך כלל האשפוזים במחלקות פנימית, טיפול נמרץ נשימתי, ועיניים גבוה במיוחד (ללא גריאטרייה); (לוח 2.35).

- התפלגות האשפוזים של בני 65+ במחלקות האשפוז מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה 47% מהאשפוזים (לוח 2.36).

- השהייה הממוצעת של בני 65+ בכלל המחלקות הכלליות בשנת 2016 הייתה 5.3 ימים לעומת 4 ימים בקרב כלל האוכלוסייה. המחלקות שבהן משך השהייה של בני 65+ הוא הארוך ביותר הן השתלת מוח עצם, גריאטרייה חריפה, עור ומין, ואונקולוגיה (לוח 2.37).

♦ בשנת 2016 קיבלו 5,934 בני 65+ (פחות מ-1% מקרב בני 65+) טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי. בני 65+ מהווים 12% מכלל המטופלים ב-2016 (לוח 2.38).

♦ ב-2016 היו 17 בני 65+ באשפוז יום פסיכיאטרי, והם היוו 8% מסך השוהים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב הקשישים הצעירים יותר: בני 65-74 מהווים 82% מכלל בני 65+ השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.39).

♦ בסוף 2016 היו 343 בני 65+ מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, שיעור של 0.4 מאושפזים ל-1,000 נפש (שיעור דומה לשיעור המאושפזים בקרב כלל האוכלוסייה). עשרה אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.40). משנת 1990 ועד שנת 2016 חלה ירידה בשיעור בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.4 ל-1,000 נפש); (לוח 2.41).

- במהלך 2016 היו 2,132 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+, ואלה היוו 9% מסך הקבלות לאשפוז. 53% מהקבלות של בני 65+ היו של נשים, וכך גבוה חלקם של בני 65-74 (67% מכלל האשפוזים של בני 65+); (לוח 2.42). שתי האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (71% מהקבלות) היו: סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות, והפרעות אפקטיביות (לוח 2.43).

- 11% מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא בשנת 2015 היו של בני 65+ (לוח 2.44).

♦ בנובמבר 2016 היו 60% מבני 65+ מבוטחים בשירותי בריאות כללית (לעומת 52% מכלל האוכלוסייה), 23% במכבי שירותי בריאות (לעומת 25%

מכלל האוכלוסייה), 7% בקופת חולים לאומית ו-10% בקופת חולים מאוחדת (לעומת 9% ו-14% מכלל האוכלוסייה בהתאמה). יש ירידה לאורך השנים באחוז בני 65+ המבוטחים בשירותי בריאות כללית. אחוז המבוטחים בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקנים המבוגרים יותר ועומד על 70% בקרב בני 85 ומעלה (לוח 2.45). 14% מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם בני 65+, 11% במכבי שירותי בריאות, 10% בקופת חולים לאומית ו-8% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.46).

## הגדרות והסברים

**כלל האוכלוסייה:** המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

**קבוצות אוכלוסייה ודת:** החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "ערבים" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

**תמותה:** הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל ושל תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ.

**תוחלת החיים** בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

**אומדני המוגבלות בקרב בני 65+ הגרים בקהילה, מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בשנים 2014-2016 בסקר החברתי שנערך על ידי הלמ"ס. לצורך אמידת מספר בני 65+ הגרים בקהילה נעשה שימוש בנתונים על אוכלוסיית המוסדות על פי מפקד דיירי המוסדות 2016 של הלמ"ס.**

**רישום השאתות הממאירות** נעשה על ידי הרישום הלאומי לסרטן במרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות וכולל גם גידולים ממוקדים וחדרניים.

**אשפוז במחלקות כלליות:** הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

**מספר האשפוזים במחלקה** מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת סך-כל המחלקות הכלליות אינו כולל העברות.

**ימי אשפוז** הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

**שהייה ממוצעת** היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

### **אשפוז פסיכיאטרי**

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ

האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

**אשפוז פסיכיאטרי:** אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

**אשפוז מלא:** מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

**אשפוז יום:** מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

**קבלות:** קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

**קבלות ראשונות:** קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

**סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.**

### נתונים מסקר בריאות

**אשפוז:** אשפוזים בבתי חולים כלליים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, כולל אשפוז יום בבתי חולים.

**רופא משפחה:** רופא כללי, רופא פנימי, רופא משפחה ורופא ילדים במרפאות בקהילה.

**רופא שיניים:** רופא שיניים ומרפא שיניים, אורתודנט, פריודנט ורופאי שיניים מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.

**ביקור אצל רופא:** ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל: ביקור אצל רופא במרפאה של קופת חולים או רופא עצמאי בהסדר קופה, במרפאת בית חולים, במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים, במרפאה פרטית, במרפאה צבאית וביקור בבית החולה. נכללו התייעצויות בטלפון אך לא נכללו ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא.

מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב-26 כדי לקבל אומדן ל-12 חודשים.

**מבקר:** אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים בשבועיים שקדמו לריאיון.

### סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים  
 .. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-30%  
 () = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 15% ל-30%

### עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

### מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומאירס-ג'וינט-ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

**לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות**

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		שנה
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
ערבים		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		שנה
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.2	75.1	80.3	76.6	80.0	76.3	1996
76.8	74.3	80.6	76.4	80.1	76.0	1997
76.8	74.4	80.7	76.4	80.3	76.1	1998
78.1	74.9	80.7	77.0	80.4	76.6	1999
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000
77.8	74.5	81.6	77.7	81.2	77.3	2001
77.9	74.7	81.9	77.9	81.5	77.5	2002
78.2	74.9	82.2	78.1	81.8	77.6	2003
79.6	75.4	82.7	78.5	82.4	78.0	2004
78.6	74.9	82.6	78.7	82.2	78.2	2005
78.5	75.1	83.0	79.2	82.5	78.7	2006
78.8	75.2	82.8	79.2	82.4	78.7	2007
79.6	75.7	83.3	79.5	83.0	79.0	2008
80.8	76.4	83.7	80.1	83.3	79.6	2009
81.3	76.6	83.9	80.3	83.6	79.7	2010
81.0	76.4	83.8	80.5	83.5	79.9	2011
80.7	76.9	84.0	80.4	83.6	79.9	2011
80.9	78.0	84.3	80.7	83.9	80.3	2013
81.2	76.8	84.5	80.9	84.1	80.3	2014
81.1	76.9	84.5	80.7	84.1	80.1	2015
<b>81.4</b>	<b>77.2</b>	<b>84.7</b>	<b>81.3</b>	<b>84.2</b>	<b>80.7</b>	<b>2016</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי \* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)



## לוח 2.2: תוחלת החיים בגיל 65, לפי דת ומין

שנים	כלל האוכלוסייה		יהודים		ערבים*	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1979-1975	14.1	15.6	14.1	15.6	14.4	15.1
1984-1980	14.6	16.0	14.6	16.0	14.7	15.4
1989-1985	15.2	16.8	15.1	16.8	15.8	16.1
1994-1990	15.8	17.8	15.8	17.9	16.0	16.4
1999-1995	16.4	18.5	16.4	18.6	16.6	17.2
2004-2000	17.5	19.7	17.7	19.8	16.0	17.2
2009-2005	18.4	20.5	18.6	20.7	16.1	17.8
2014-2010	19.0	21.2	19.3	21.4	17.0	19.1
<b>2016-2012</b>	<b>19.1</b>	<b>21.4</b>	<b>19.4</b>	<b>21.6</b>	<b>17.1</b>	<b>19.2</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי  
\* עד 1995, בני דתות אחרות

### לוח 2.3: תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין

שנים	בגיל 75		בגיל 80		בגיל 85		בגיל 95	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1979-1975	8.5	9.2	6.5	6.9	4.9	5.1		
1984-1980	8.7	9.3	6.6	6.8	4.6	4.9		
1989-1985	9.2	10.0	6.7	7.4	5.0	5.4		
1994-1990	9.6	10.7	7.3	8.0	5.4	5.8		
1999-1995	10.1	11.1	7.5	8.1	5.6	5.8		
2004-2000	11.0	12.1	8.5	9.0	6.5	6.5		
2009-2005	11.5	12.6	8.7	9.4	6.6	6.8		
2014-2010	11.8	13.1	8.8	9.6	6.4	6.9	3.3	3.4
<b>2016-2012</b>	<b>11.9</b>	<b>13.2</b>	<b>8.8</b>	<b>9.7</b>	<b>6.3</b>	<b>6.8</b>	<b>3.2</b>	<b>3.3</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

### לוח 2.4: פטירות של בני +65, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2015

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

גיל	סה"כ			יהודים ואחרים <sup>(1)</sup>			ערבים		
	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	
<b>בני +65</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	
בני 65-69	11	14	8	10	14	8	20	12	
בני 70-74	18	23	14	17	22	13	33	22	
<b>בני +75</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>72</b>	
בני 75-79	32	39	26	30	38	25	58	38	
בני 80-84	58	68	51	57	67	50	84	74	
<b>בני +85</b>	<b>142</b>	<b>154</b>	<b>135</b>	<b>142</b>	<b>153</b>	<b>135</b>	<b>160</b>	<b>149</b>	
בני 85-89	108	121	101	107	120	99	141	135	
בני 90-95	184	203	173	184	203	173	208	166	
<b>בני +95</b>	<b>246</b>	<b>233</b>	<b>255</b>	<b>251</b>	<b>238</b>	<b>260</b>	<b>175</b>	<b>188</b>	
שיעורים מתוקננים בני +65 <sup>(2)</sup>	40	45	34	39	44	34	56	45	

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. אוכלוסיית התקן היא ממוצע (גברים ונשים) של כלל האוכלוסייה בשנת 2015 לפי קבוצת גיל

**לוח 2.5: פטירות של יהודים ואחרים<sup>(1)</sup> בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2015**

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

	בני 75+			בני 74-65			65+	מאפיינים
	80+	79-75	סה"כ	74-70	69-65	סה"כ		
	106	34	76	21	12	15	43	סה"כ
	115	43	83	26	15	19	46	גברים
	100	28	71	16	9	11	40	נשים
	133	47	85	28	14	19	40	סה"כ ילידי ישראל <sup>(2)</sup>
	147	57	95	34	17	23	45	גברים
	123	38	78	22	11	15	36	נשים
	94	31	68	17	11	14	39	סה"כ ילידי אסיה
	104	38	75	22	14	17	43	גברים
	86	24	62	12	8	10	36	נשים
	94	32	66	19	12	15	36	סה"כ ילידי אפריקה
	101	38	72	24	15	19	40	גברים
	89	28	62	14	8	11	33	נשים
	107	31	79	18	11	13	48	סה"כ ילידי אירופה-אמריקה
	116	39	86	24	15	18	51	גברים
	102	25	75	14	8	10	45	נשים
	100	31	68	19	12	14	42	מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(3)</sup>
	113	41	77	27	17	20	48	גברים
	92	25	62	14	8	10	38	נשים

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.6: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים\*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות**

אחוזים			
מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>2010</b>			
<b>בני 65+</b>	<b>68.2</b>	<b>69.7</b>	<b>66.9</b>
בני 74-65	71.5	70.8	72.2
בני 75+	67.5	69.4	66.0
בני 64-0	62.7	58.0	70.4
כלל האוכלוסייה	67.1	66.7	67.5
<b>2015</b>			
<b>בני 65+</b>	<b>66.3</b>	<b>68.4</b>	<b>64.4</b>
בני 74-65	70.8	70.0	72.0
בני 75+	65.3	67.9	63.1
בני 64-0	65.0	61.6	70.9
כלל האוכלוסייה	66.1	66.8	65.3
<b>2016</b>			
<b>בני 65+</b>	<b>65.9</b>	<b>68.3</b>	<b>63.9</b>
בני 74-65	69.6	69.2	70.2
בני 75+	65.0	67.9	62.8
בני 64-0	65.4	61.1	72.4
כלל האוכלוסייה	65.8	66.6	65.1
<b>2017</b>			
<b>בני 65+</b>	<b>65.6</b>	<b>67.6</b>	<b>63.6</b>
בני 74-65	69.7	69.6	69.9
בני 75+	64.5	66.9	62.5
בני 64-0	64.6	60.8	71.0
כלל האוכלוסייה	65.4	66.1	64.7

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות \* חלק מבתי החולים למחלות ממושכות לא נכללו בלוח. לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

**לוח 2.7: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2015**

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני 65+			סיבות פטירה
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
519	538	531	3,677	4,225	3,919	<b>סה"כ*</b>
31	29	30	239	252	245	מחלות זיהומיות
128	138	133	776	1,047	896	שאתות ממאירות
31	30	30	232	253	241	סוכרת
13	9	11	104	86	96	יתר לחץ-דם
13	17	15	106	134	118	אוטם חריף של שריר הלב
27	37	32	210	332	264	מחלת לב איסכמית אחרת
33	26	30	253	233	244	מחלות לב אחרות
32	26	29	250	240	245	מחלות של כלי דם במוח
5	6	6	36	52	43	מחלות אחרות של מחזור הדם
15	14	15	118	132	124	דלקת ריאות
14	18	16	110	159	132	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
13	13	13	101	112	106	יתר מחלות מערכת הנשימה
5	5	5	30	31	31	מחלות כבד
19	21	20	148	197	170	מחלות כליה
3	3	3	0	0	0	מומים מולדים
26	36	31	170	205	186	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
95	77	86	714	644	683	כל המחלות האחרות
2	7	5	9	18	13	תאונות דרכים
2	7	4	5	13	8	פגיעה עצמית מכוונת
10	15	13	67	85	75	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי \* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

**לוח 2.8: סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2015**

שיעורים ל-100,000 נפש

סיבות פטירה	נשים			גברים		
	85+	84-75	74-65	85+	84-75	74-65
<b>סה"כ*</b>	<b>13,483</b>	<b>3,630</b>	<b>1,028</b>	<b>15,342</b>	<b>5,016</b>	<b>1,726</b>
מחלות זיהומיות	922	229	59	1,002	297	87
שאתות ממאירות	1,685	947	423	2,461	1,374	611
סוכרת	817	243	65	851	316	107
יתר לחץ-דם	481	85	12	439	76	25
אוטם חריף של שריר הלב	429	98	22	545	148	49
מחלת לב איסכמית אחרת	962	169	30	1,482	353	106
מחלות לב אחרות	1,075	221	48	1,036	251	74
מחלות של כלי דם במוח	986	254	46	878	319	79
מחלות אחרות של מחזור הדם	140	38	7	176	68	21
דלקת ריאות	516	103	18	637	142	32
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	415	107	28	495	222	63
יתר מחלות מערכת הנשימה	446	93	13	525	120	30
מחלות כבד	42	41	21	74	34	21
מחלות כליה	571	142	36	820	236	60
מומים מולדים	0	0	0	0	0	0
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	688	143	45	696	222	105
כל המחלות האחרות	3,006	643	131	2,830	709	200
תאונות דרכים	8	11	8	27	21	14
פגיעה עצמית מכוונת	8	5	4	23	16	9
כל הסיבות החיצוניות האחרות	285	58	14	347	93	32

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי \* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9א: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2015

סיבות פטירה	קבוצת גיל				כלל האוכלוסייה
	85+	84-75	74-65	65+	
סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*	16,848	12,291	6,894	36,033	44,262
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
מחלות זיהומיות	6.7	6.1	5.3	6.2	5.7
שאתות ממאירות	13.9	26.8	37.7	22.9	25.1
סוכרת	5.9	6.5	6.3	6.1	5.7
יתר לחץ-דם	3.3	1.9	1.3	2.4	2.1
אוטם חריף של שריר הלב	3.3	2.8	2.6	3.0	2.8
מחלת לב איסכמית אחרת	8.2	5.9	4.8	6.7	6.0
מחלות לב אחרות	7.5	5.5	4.4	6.2	5.6
מחלות של כלי דם במוח	6.7	6.7	4.5	6.3	5.5
מחלות אחרות של מחזור הדם	1.1	1.2	1.0	1.1	1.1
דלקת ריאות	4.0	2.8	1.8	3.2	2.8
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	3.1	3.7	3.3	3.4	3.0
יתר מחלות מערכת הנשימה	3.4	2.5	1.5	2.7	2.5
מחלות כבד	0.4	0.9	1.6	0.8	0.9
מחלות כליה	4.7	4.3	3.5	4.3	3.8
מומים מולדים	..	..	..	..	0.6
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	4.9	4.2	5.4	4.7	5.8
כל המחלות האחרות	20.7	15.9	12.1	17.4	16.3
תאונות דרכים	0.1	0.4	0.8	0.3	0.9
פגיעה עצמית מכוונת	0.1	0.2	0.5	0.2	0.8
כל הסיבות החיצוניות האחרות	2.2	1.7	1.6	1.9	2.4

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי \* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ ושל כלל הגברים, לפי גיל, 2015

קבוצת גיל				כלל הגברים	סיבות פטירה
85+	84-75	74-65	65+		
6,814	6,241	4,091	17,146	22,330	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
6.5	5.9	5.1	6.0	5.5	מחלות זיהומיות
16.0	27.4	35.4	24.8	25.6	שאתות ממאירות
5.5	6.3	6.2	6.0	5.5	סוכרת
2.9	1.5	1.4	2.0	1.7	יתר לחץ-דם
3.6	2.9	2.9	3.2	3.1	אוטם חריף של שריר הלב
9.7	7.0	6.2	7.9	6.8	מחלת לב איסכמית אחרת
6.8	5.0	4.3	5.5	4.9	מחלות לב אחרות
5.7	6.4	4.5	5.7	4.9	מחלות של כלי דם במוח
1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	מחלות אחרות של מחזור הדם
4.2	2.8	1.9	3.1	2.6	דלקת ריאות
3.2	4.4	3.7	3.8	3.3	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.4	2.4	1.7	2.6	2.4	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.5	0.7	1.2	0.7	1.0	מחלות כבד
5.3	4.7	3.5	4.7	3.9	מחלות כליה
..	..	..	..	0.6	מומים מולדים
4.5	4.4	6.1	4.9	6.7	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
18.4	14.1	11.6	15.2	14.3	כל המחלות האחרות
(0.2)	0.4	0.8	0.4	1.2	תאונות דרכים
(0.1)	0.3	0.5	0.3	1.2	פגיעה עצמית מכוונת
2.3	1.9	1.8	2.0	2.9	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי \* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות



לוח 2.9ג: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות 65+ ושל כלל הנשים, לפי גיל, 2015

	קבוצת גיל				כלל הנשים	סיבות פטירה
	85+	84-75	74-65	65+		
	10,034	6,050	2,803	18,887	21,932	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
	6.8	6.3	5.7	6.5	6.0	מחלות זיהומיות
	12.5	26.1	41.1	21.1	24.6	שאתות ממאירות
	6.1	6.7	6.3	6.3	5.9	סוכרת
	3.6	2.3	1.2	2.8	2.5	יתר לחץ-דם
	3.2	2.7	2.1	2.9	2.6	אוטם חריף של שריר הלב
	7.1	4.6	2.9	5.7	5.1	מחלת לב איסכמית אחרת
	8.0	6.1	4.6	6.9	6.3	מחלות לב אחרות
	7.3	7.0	4.4	6.8	6.2	מחלות של כלי דם במוח
	1.0	1.0	0.6	1.0	0.9	מחלות אחרות של מחזור הדם
	3.8	2.8	1.8	3.2	2.9	דלקת ריאות
	3.1	3.0	2.7	3.0	2.8	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
	3.3	2.6	1.2	2.8	2.6	יתר מחלות מערכת הנשימה
	0.3	1.1	2.0	0.8	0.9	מחלות כבד
	4.2	3.9	3.5	4.0	3.7	מחלות כליה
	..	..	..	..	0.6	מומים מולדים
	5.1	4.0	4.4	4.6	4.9	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
	22.3	17.7	12.7	19.4	18.3	כל המחלות האחרות
	(0.1)	(0.3)	0.7	0.2	0.5	תאונות דרכים
	(0.1)	(0.1)	(0.4)	0.1	0.3	פגיעה עצמית מכוונת
	2.1	1.6	1.4	1.8	1.9	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי \* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

**לוח 2.10: התאבדויות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות**

שנה	65+		74-65		75+		כלל האוכלוסייה	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1981	34	31	24	22	10	9	132	79
1990	59	26	30	14	29	12	220	84
2000	58	28	19	15	39	13	307	87
2005	55	33	20	10	35	23	304	121
2006	46	18	24	5	22	13	279	88
2007	48	15	19	8	29	7	263	63
2008	62	20	19	9	43	11	294	60
2009	44	14	21	6	23	8	310	94
2010	73	23	33	14	40	9	394	86
2011	72	15	28	8	44	7	322	87
2012	66	20	31	11	35	9	354	81
2013	53	20	19	8	34	12	291	81

**אחוזים מכלל ההתאבדויות**

שנה	64-0	74-65	75+	סה"כ	65+
1981	69.2	21.8	9.0	100.0	30.8
1990	72.0	14.5	13.5	100.0	28.0
2000	78.2	8.6	13.2	100.0	21.8
2005	79.3	7.1	13.6	100.0	20.7
2006	82.6	7.9	9.5	100.0	17.4
2007	80.7	8.3	11.0	100.0	19.3
2008	76.8	7.9	15.3	100.0	23.2
2009	85.6	6.7	7.7	100.0	14.4
2010	80.0	9.8	10.2	100.0	20.0
2011	78.7	8.8	12.5	100.0	21.3
2012	80.2	9.7	10.1	100.0	19.8
2013	80.4	7.3	12.4	100.0	19.6

מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.11: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, 2014-2016

אחוזים			
מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
טוב מאוד	14.0	16.7	11.8
טוב	41.7	43.5	40.3
לא כל כך טוב	30.2	27.2	32.5
בכלל לא טוב	14.2	12.6	15.5
<b>כלל האוכלוסייה*</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
טוב מאוד	52.6	55.1	50.3
טוב	31.5	30.9	32.0
לא כל כך טוב	11.6	10.0	13.1
בכלל לא טוב	4.3	4.0	4.5
<b>דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאוד בדרך כלל</b>			
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>55.6</b>	<b>60.2</b>	<b>52.0</b>
<b>גיל</b>			
74-65	65.4	68.4	62.9
75+	40.9	36.5	47.0
<b>כלל האוכלוסייה*</b>	<b>84.1</b>	<b>82.3</b>	<b>86.0</b>

מקור: למ"ס, הסקר החברתי \* אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

**לוח 2.12: בני 65+ וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג פעילות, גיל ומין, 2010**

			אחוזים
נשים	גברים	סה"כ	מאפיינים
<b>עוסקים בפעילות גופנית<sup>(1)</sup></b>			
<b>43.3</b>	<b>51.3</b>	<b>46.8</b>	<b>סה"כ בני 65+</b>
45.8	54.2	49.5	74-65
40.2	47.5	43.4	75+
46.7	55.3	50.9	כלל האוכלוסייה <sup>(3)</sup>
<b>עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע<sup>(1)</sup></b>			
<b>31.9</b>	<b>40.4</b>	<b>35.6</b>	<b>סה"כ בני 65+</b>
34.4	42.2	37.9	74-65
28.7	38.1	32.8	75+
28.1	34.3	31.1	כלל האוכלוסייה <sup>(3)</sup>
<b>עוסקים בפעילות גופנית מאומצת (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)<sup>(2)</sup></b>			
<b>8.7</b>	<b>15.3</b>	<b>11.9</b>	<b>סה"כ בני 65+</b>
12.6	20.4	16.4	74-65
..	(7.8)	(5.4)	75+
40.0	56.6	48.7	כלל האוכלוסייה <sup>(3)</sup>
<b>עוסקים בפעילות גופנית מתונה (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)<sup>(2)</sup></b>			
<b>82.7</b>	<b>88.9</b>	<b>85.7</b>	<b>סה"כ בני 65+</b>
85.7	87.2	86.4	74-65
78.4	91.4	84.6	75+
75.8	69.0	72.2	כלל האוכלוסייה <sup>(3)</sup>

←

**לוח 2.12: בני 65+ וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג פעילות, גיל ומין, 2010 (המשך)**

			אחוזים
נשים	גברים	סה"כ	מאפיינים
<b>עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק שרירים (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)</b>			
<b>32.5</b>	<b>23.0</b>	<b>27.9</b>	<b>סה"כ בני 65+</b>
32.6	22.9	27.9	74-65
32.3	23.1	27.9	75+
33.0	34.0	33.5	כלל האוכלוסייה <sup>(3)</sup>
<b>סיבה עיקרית לאי-עיסוק בפעילות גופנית (מתוך שאינם עוסקים בפעילות גופנית)</b>			
<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>סה"כ בני 65+</b>
64.3	54.0	60.2	בעיה בריאותית או גופנית
9.5	14.8	11.6	לא נראה חשוב
7.6	7.3	7.5	עייפות
6.7	7.3	6.9	חוסר בזמן
5.6	8.3	6.7	סיבה אחרת
(3.5)	(4.0)	3.7	שעמום
(2.8)	(4.3)	3.4	אין תנאים מתאימים בקרבת הבית או העבודה

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בשלושה החודשים שקדמו לראיון
2. שנמשכה לפחות 10 דקות ברצף
3. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

**לוח 2.13: בני 65+ וכלל האוכלוסייה לפי מדד BMI<sup>(1)</sup>, גיל ומין, 2010**

אחוזים

מאפיינים	בני 65+			כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>
	נשים	גברים	סה"כ	
<b>סה"כ</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
תת משקל (עד 18.4)	2.9	1.5	1.4	1.5
משקל תקין (18.5 עד 24.9)	46.6	32.0	32.1	32.1
משקל עודף (25 עד 29.9)	34.5	40.2	47.9	43.7
השמנה (30 עד 34.9)	12.1	18.9	14.1	16.7
השמנת יתר (35 ומעלה)	3.9	7.4	4.4	6.0
<b>סובלים מהשמנה (BMI 30 ומעלה)</b>				
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>26.3</b>	<b>18.5</b>	<b>22.7</b>	
<b>גיל</b>				
74-65	29.2	19.2	24.6	
75+	22.4	17.7	20.2	
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>				
יהודים ואחרים	25.6	18.5	22.4	
ערבים	36.6	(18.4)	27.0	
<b>כלל האוכלוסייה<sup>(2)</sup></b>	<b>16.8</b>	<b>15.3</b>	<b>16.0</b>	

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. מדד BMI לבדיקת יחס גובה ומשקל, נקבע באמצעות חלוקת המשקל בק"ג בריבוע הגובה במטרים
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

**לוח 2.14: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המעשנים, לפי גיל ומין, 2010**

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>מעשנים כיום, לפחות פעם בשבוע</b>	<b>11.6</b>	<b>16.1</b>	<b>8.1</b>
מעשנים סיגריות כיום (מתוך המעשנים לפחות פעם בשבוע)	95.4	95.2	95.8
מעשנים לפי מספר הסיגריות ביום			
סה"כ <sup>(1)</sup>	100.0	100.0	100.0
5-1	15.2	(15.4)	(14.7)
10-6	27.5	20.6	38.4
20-11	42.4	48.7	32.4
40-21	(9.6)	(9.7)	..
<b>עישנו בעבר, לפחות פעם בשבוע, והפסיקו</b>	<b>33.7</b>	<b>56.6</b>	<b>17.3</b>
גיל הפסקת עישון (מתוך אלו שעישנו בעבר והפסיקו)			
סה"כ	100.0	100.0	100.0
עד 19	2.5	3.1	0.9
20-29	10.3	11.2	8.3
30-39	14.3	14.4	14.1
40-49	21.4	23.7	16.0
50-59	25.2	24.5	27.0
60 ומעלה	26.3	23.1	33.8
<b>כלל האוכלוסייה<sup>(2)</sup> המעשנים</b>	<b>24.6</b>	<b>36.5</b>	<b>15.7</b>
<b>כיום לפחות פעם בשבוע</b>			

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. הסה"כ כולל גם מעשנים פחות מסיגרייה ליום או מעשנים יותר מ-40 סיגריות ביום
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.15: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה<sup>(1)</sup>, לפי גיל ומין, 2010

אחוזים

מאפיינים	בני 65+			כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>
	נשים	גברים	סה"כ	
<b>דיווחו על קושי להירדם או לישון במשך לילה שלם</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
בכל לילה או כמעט בכל לילה	14.4	26.7	30.3	
פעמיים - שלוש בשבוע	11.3	10.9	13.5	
פעם בשבוע או פחות	13.3	9.8	11.6	
לא היה קושי	61.0	52.6	44.6	
<b>דיווחו על קושי כלשהו להירדם או לישון במשך לילה שלם</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>39.0</b>	<b>47.4</b>	<b>55.4</b>	
74-65	57.8	43.9	51.7	
75+	66.4	51.8	60.0	
<b>דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום, בגלל בעיות שינה<sup>(3)</sup></b>				
<b>סה"כ</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
עייפות רבה מאד	15.6	16.1	22.0	
עייפות רבה	30.2	29.5	33.6	
עייפות קלה	38.6	36.1	28.4	
אין עייפות כלל	15.6	18.3	16.0	
<b>דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום כלשהם במשך היום, בגלל בעיות שינה<sup>(3)</sup></b>				
<b>סה"כ</b>	<b>84.4</b>	<b>81.7</b>	<b>84.0</b>	
74-65	82.1	79.7	81.2	
75+	89.0	83.8	87.0	

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בחודש האחרון

2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה

3. מתוך אלו שיש להם קשיים להירדם או לישון



**לוח 2.16: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי-פעם מחלה מהמחלות הבאות ואלו שנטלו תרופה למחלה זו, לפי מין, 2009**

אחוזים

המחלה	בני 65+			כלל האוכלוסייה
	נשים	גברים	סה"כ	
יתר לחץ דם	57.3	48.7	53.5	11.1
התקף לב, אוטם שריר הלב	8.8	18.3	13.0	2.2
מחלת לב אחרת <sup>(1)</sup>	15.0	13.4	14.3	2.7
שבץ מוחי	5.4	5.8	5.6	0.9
סוכרת	23.8	21.7	22.9	4.9
אסתמה	7.3	5.7	6.6	3.7
מחלת ריאות כרונית	7.3	5.5	6.5	1.7
בעיה כרונית במערכת העיכול	13.9	8.8	11.6	2.7
מחלה ממארת - סרטן	8.4	8.1	8.3	1.6
דיכאון או חרדה	10.7	5.4	8.4	2.5
<b>נטלו תרופות לפי מרשם רופא בגלל מחלה זו<sup>(2)</sup></b>				
יתר לחץ דם	95.8	95.1	95.5	87.6
התקף לב, אוטם שריר הלב	83.8	89.7	87.5	87.8
מחלת לב אחרת <sup>(1)</sup>	78.8	86.7	82.1	72.9
שבץ מוחי	79.4	70.4	75.2	78.6
סוכרת	93.8	89.4	92.0	88.8
אסתמה	83.7	87.4	85.1	76.3
מחלת ריאות כרונית	72.0	68.9	70.9	63.9
בעיה כרונית במערכת העיכול	83.9	79.1	82.3	79.1
מחלה ממארת - סרטן	41.1	43.2	42.0	42.8
דיכאון או חרדה	68.0	82.3	72.0	73.4

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל הפרעות בקצב הלב
2. מתוך אלו שדיווחו על המחלה

לוח 2.17: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2015

סוף שנה

מאפיינים	65+	69-65	74-70	79-75	84-80	85+	כלל האוכלוסייה
<b>מספרים מוחלטים</b>							
סה"כ	15,839	4,522	3,163	3,422	2,241	2,491	29,488
גברים	8,012	2,337	1,670	1,809	1,114	1,082	13,175
נשים	7,827	2,185	1,493	1,613	1,127	1,409	16,313
<b>שיעורים ל-100,000 נפש</b>							
סה"כ	1,722	1,410	1,673	1,978	1,898	2,095	352
גברים סה"כ	1,973	1,556	1,922	2,396	2,278	2,431	317
מזה: קיבה	71	50	52	103	117	74	10
מעג גס וחלחולת	245	176	221	327	274	353	36
ריאה	255	212	268	330	280	225	38
ערמונית	366	369	423	421	270	254	49
שלפוחית השתן	220	142	209	265	319	315	30
לימפומה ממארת	100	80	90	118	133	121	22
ליקמיה	46	23	45	52	59	99	9
נשים סה"כ	1,524	1,282	1,461	1,654	1,629	1,894	386
מזה: קיבה	38	21	24	53	48	66	7
מעג גס וחלחולת	196	116	155	254	251	305	36
ריאה	122	94	121	131	126	173	22
שד	430	481	505	380	367	331	129
שחלה	56	40	38	48	35	37	9
שלפוחית השתן	42	24	33	61	55	62	7
לימפומה ממארת	86	66	80	106	108	89	21
ליקמיה	33	15	21	43	48	69	7

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

**לוח 2.18: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות**

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	2006	2008	2010	2012	2014	2015
<b>גברים</b>						
סה"כ יהודים ואחרים*	2,309	2,281	2,287	2,195	2,045	2,006
מזה: קיבה	91	89	91	84	82	74
מעיי גס וחלחולת	379	378	307	305	258	248
ריאה	231	229	252	227	245	242
ערמונית	556	611	559	523	422	377
שלפוחית השתן	236	238	239	243	234	222
לימפומה ממארת	111	95	97	104	107	103
ליקמיה	58	37	62	53	46	46
סה"כ ערבים	2,062	2,005	2,286	1,961	1,618	1,628
מזה: קיבה	101	52	57	70	69	37
מעיי גס וחלחולת	229	284	305	266	225	210
ריאה	392	372	449	388	381	401
ערמונית	353	365	354	389	264	248
שלפוחית השתן	309	184	255	195	165	193
לימפומה ממארת	95	73	82	67	60	66
ליקמיה	66	52	73	71	33	43
<b>נשים</b>						
סה"כ יהודיות ואחרות*	1,468	1,564	1,578	1,505	1,497	1,562
מזה: קיבה	47	48	47	33	36	39
מעיי גס וחלחולת	243	259	222	184	194	198
ריאה	85	98	111	110	130	126
שד	343	396	394	408	365	442
שחלה	40	39	36	36	37	41
שלפוחית השתן	37	43	38	37	48	44
לימפומה ממארת	76	72	67	71	83	86
ליקמיה	31	28	31	34	24	34
סה"כ ערביות	995	1,182	1,181	1,095	882	1,078
מזה: קיבה	52	33	34	66	38	25
מעיי גס וחלחולת	151	215	202	173	124	169
ריאה	48	58	58	40	58	78
שד	219	286	205	242	213	282
שלפוחית השתן	18	36	12	27	11	29

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

\* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.19: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים בני +65,  
לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2015

סוף שנה

מאפיינים	65+	69-65	74-70	75+
<b>מספרים מוחלטים</b>				
<b>סה"כ יהודים בני +65</b>	<b>14,374</b>	4,102	2,743	7,529
<b>גברים</b>	<b>7,168</b>	2,108	1,425	3,635
<b>נשים</b>	<b>7,206</b>	1,994	1,318	3,894
<b>שיעורים ל-100,000 נפש</b>				
<b>גברים</b>				
ילידי ישראל	<b>1,861</b>	1,880	1,356	2,426
ילידי אירופה-אמריקה	<b>2,272</b>	2,553	1,341	2,598
ילידי אסיה	<b>1,749</b>	1,556	1,370	2,098
ילידי אפריקה	<b>1,774</b>	1,739	1,543	1,972
<b>נשים</b>				
ילידות ישראל	<b>1,595</b>	1,789	1,186	1,809
ילידות אירופה-אמריקה	<b>1,800</b>	2,078	1,159	1,942
ילידות אסיה	<b>1,359</b>	1,233	1,072	1,565
ילידות אפריקה	<b>1,297</b>	1,195	1,040	1,531

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות

לוח 2.20: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2016

אחוזים, סוף שנה

להתלבש או להתרחץ			ללכת או לעלות במדרגות			סה"כ	סה"כ באלפים	מאפיינים
יש קושי רב <sup>(1)</sup>	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב <sup>(1)</sup>	יש קושי מועט	אין קושי			
13.6	12.1	74.3	31.0	16.8	52.2	100.0	955.8	<b>סה"כ בני 65+</b>
<b>גיל</b>								
7.3	8.9	83.8	21.8	16.1	62.2	100.0	554.7	בני 65-74
23.0	17.0	60.0	44.9	17.8	37.3	100.0	401.0	בני 75+
<b>מין</b>								
12.0	10.4	77.7	26.6	14.7	58.7	100.0	426.7	גברים
14.8	13.6	71.6	34.5	18.4	47.1	100.0	529.0	נשים
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>								
11.8	11.6	76.6	28.9	16.9	54.1	100.0	874.6	יהודים ואחרים מזה: עולי
16.4	17.8	65.9	37.1	25.2	37.7	100.0	174.7	בריה"מ לשעבר
33.8	19.0	47.2	55.8	14.8	29.5	100.0	81.1	ערבים
לזכור או להתרכז			פעולות הקשורות למשק הבית <sup>(2)</sup>			סה"כ	סה"כ באלפים	מאפיינים
יש קושי רב <sup>(1)</sup>	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב <sup>(1)</sup>	יש קושי מועט	אין קושי			
9.9	31.9	58.1	27.2	15.1	57.6	100.0	955.8	<b>סה"כ בני 65+</b>
<b>גיל</b>								
5.8	27.2	67.1	17.4	13.5	69.1	100.0	554.7	בני 65-74
16.2	39.0	44.7	42.1	17.5	40.4	100.0	401.0	בני 75+
<b>מין</b>								
9.1	30.7	60.2	22.1	12.4	65.5	100.0	426.7	גברים
10.6	32.9	56.5	31.3	17.3	51.5	100.0	529.0	נשים
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>								
9.0	31.7	59.3	24.9	15.3	59.8	100.0	874.6	יהודים ואחרים מזה: עולי
13.4	32.9	53.7	30.8	23.0	46.3	100.0	174.7	בריה"מ לשעבר
20.6	34.2	45.2	55.2	12.9	32.0	100.0	81.1	ערבים

←

**לוח 2.20: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2016 (המשך)**

אחוזים, סוף שנה

מאפיינים	סה"כ באלפים	סה"כ	לראות <sup>(3)</sup>			לשמוע <sup>(4)</sup>		
			אין קושי	קושי מועט	קושי רב <sup>(1)</sup>	אין קושי	קושי מועט	קושי רב <sup>(1)</sup>
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>955.8</b>	<b>100.0</b>	<b>68.1</b>	<b>23.5</b>	<b>8.4</b>	<b>61.4</b>	<b>28.5</b>	<b>10.1</b>
<b>גיל</b>								
בני 65-74	554.7	100.0	77.7	17.8	4.4	70.3	24.1	5.6
בני 75+	401.0	100.0	53.8	32.0	14.3	48.2	35.0	16.9
<b>מין</b>								
גברים	426.7	100.0	70.1	22.5	7.4	56.6	31.2	12.2
נשים	529.0	100.0	66.6	24.3	9.1	65.3	26.3	8.5
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>								
יהודים ואחרים	874.6	100.0	69.8	22.2	8.0	62.1	27.8	10.2
מזה: עולי בריה"מ לשעבר	174.7	100.0	63.3	26.3	10.3	62.1	25.8	12.1
ערבים	81.1	100.0	49.0	38.3	12.7	53.9	36.7	9.5

מקור: למ"ס, עיבוד על נתוני הסקר החברתי לשנים 2014-2016; למ"ס, עיבוד מיוחד על האוכלוסייה המבוגרת במוסדות לטיפול ממושך מתוך מפקד המוסדות 2016

1. כולל אלה שאינם יכולים כלל לבצע את הפעולה/תפקוד
2. כגון: נקיון, קניות וסידורים מחוץ לבית
3. גם כאשר מרכיב/ה משקפיים
4. גם כאשר מרכיב/ה מכשיר שמיעה

**לוח 2.21: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2016**

מספרים מוחלטים

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
<b>בני 65+</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>2,226</b>	<b>78</b>	<b>354</b>	<b>1,794</b>
גברים	1,224	52	172	1,000
נשים	1,002	26	182	794
<b>בני 65-74</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>1,323</b>	<b>28</b>	<b>176</b>	<b>1,119</b>
גברים	728	20	87	621
נשים	595	8	89	498
<b>בני 75+</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>903</b>	<b>50</b>	<b>178</b>	<b>675</b>
גברים	496	32	85	379
נשים	407	18	93	296
<b>בני 65+ לפי מעמד הנפגע</b>				
הולך רגל	777	42	209	526
נהג רכב	852	17	53	782
נוסע ברכב	494	14	63	417
אחר	103	5	29	69
<b>בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*</b>				
יהודים	1,971	66	310	1,595
ערבים	187	9	30	148
<b>כלל האוכלוסייה</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>22,236</b>	<b>335</b>	<b>1,845</b>	<b>20,056</b>
גברים	13,069	254	1,254	11,561
נשים	9,167	81	591	8,495

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

\* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

**לוח 2.22: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2016**

שיעורים ל-100,000 נפש

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
<b>בני 65+</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>232</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>187</b>
גברים	288	12	41	236
נשים	188	5	34	149
<b>בני 65-74</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>244</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>207</b>
גברים	289	8	34	246
נשים	206	3	31	172
<b>בני 75+</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>217</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>162</b>
גברים	288	19	49	220
נשים	166	7	38	121
<b>בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*</b>				
יהודים	235	8	37	190
ערבים	321	15	51	254
<b>כלל האוכלוסייה</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>260</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>235</b>
גברים	308	6	30	273
נשים	213	2	14	197

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

\* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים



**לוח 2.23: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות**

שיעורים ל-100,000 נפש

שנה	סה"כ נפגעים		מזה: הרוגים	
	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה
1985	378	442	24	9
1990	459	594	23	9
1996	408	818	23	9
1997	385	814	21	9
1998	379	826	21	9
1999	363	743	18	8
2001	219	584	12	8
2002	290	581	16	8
2003	273	554	12	7
2004	283	542	13	7
2005	277	512	12	6
2006	295	509	12	6
2007	278	457	11	6
2008	275	435	11	6
2009	249	425	8	4
2010	250	368	10	5
2011	253	349	8	4
2012	226	302	7	3
2103	249	301	6	3
2014	225	267	7	3
2015	234	264	11	4
<b>2016</b>	<b>232</b>	<b>260</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

מקורות: למ"ס; משרד הבריאות

**לוח 2.24: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2016**

מאפיינים	חומרת התאונות				
	קלות	קשות	קטלניות		סה"כ
<b>מספרים מוחלטים</b>					
<b>נהגים מעורבים בני 65+</b>	<b>1,889</b>	<b>278</b>	<b>48</b>	<b>2,215</b>	
<b>גיל</b>					
בני 65-74	1,284	187	32	1,503	
בני 75+	605	91	16	712	
<b>מין</b>					
גברים	1,514	232	42	1,788	
נשים	375	46	6	427	
<b>כלל הנהגים המעורבים</b>					
סה"כ <sup>(1)</sup>	18,803	2,494	498	21,795	
גברים	12,571	1,915	416	14,902	
נשים	4,910	410	52	5,372	
<b>שיעורים ל-10,000 נהגים<sup>(2)</sup></b>					
<b>נהגים מעורבים בני 65+</b>					
סה"כ	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	
גברים	52	8	1	62	
נשים	22	3	0	26	
<b>כלל הנהגים המעורבים</b>					
סה"כ	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	
גברים	55	8	2	65	
נשים	28	2	0	30	

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2016 ובסוף 2015

**לוח 2.25: בני 65+ וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא או התייעצו איתו בטלפון בשבועיים האחרונים, לפי מין והתמחות הרופא, 2009**

אחוזים

הרופא	בני 65+			כלל האוכלוסייה
	נשים	גברים	סה"כ	
רופא משפחה או רופא כללי <sup>(1)</sup>	32.0	29.1	30.7	9.5
רופא פנימי <sup>(2)</sup>	0.7	0.6	0.7	0.2
רופא עור ומין	0.7	0.8	0.7	0.6
רופא אורתופד	3.3	1.9	2.7	1.3
רופא קרדיולוג	1.6	2.2	1.8	0.4
רופא נשים	0.8		0.8	1.9
רופא אורולוג	0.6	1.9	1.2	0.3
רופא אף אוזן גרון	1.0	0.9	0.9	0.5
רופא נוירולוג	0.8	1.2	1.0	0.3
רופא כירורג	0.7	1.4	1.0	0.4
רופא עיניים	2.3	2.3	2.3	0.6
רופא ריאות	0.4	0.2	0.3	0.1
רופא פסיכיאטר	0.2	0.2	0.2	0.2

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים, מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
2. רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או במרפאת בית חולים

**לוח 2.26: ביקורים של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהלך שנה, לפי מין והתמחות הרופא, 2009**

ממוצע לנפש

הרופא	בני +65			כלל האוכלוסייה
	נשים	גברים	סה"כ	
רופא משפחה או רופא כללי <sup>(1)</sup>	11.6	10.8	11.2	3.2
רופא פנימי <sup>(2)</sup>	0.3	0.2	0.2	0.1
רופא עור ומין	0.2	0.2	0.2	0.2
רופא אורתופד	1.0	0.5	0.8	0.4
רופא קרדיולוג	0.4	0.5	0.5	0.1
רופא נשים	0.2		0.2	0.6
רופא אורולוג	0.2	0.5	0.3	0.1
רופא אף אוזן גרון	0.3	0.2	0.3	0.1
רופא נוירולוג	0.2	0.3	0.2	0.1
רופא כירורג	0.1	0.4	0.3	0.1
רופא עיניים	0.7	0.6	0.6	0.2
רופא ריאות	0.2	0.0	0.1	0.0
רופא פסיכיאטר	0.1	0.1	0.1	0.0

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים, מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
2. רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או במרפאת בית חולים

**לוח 2.27: ביקורים<sup>(1)</sup> של בני 65+ אצל רופא מתוך סך הביקורים של כלל האוכלוסייה במהלך שנה, לפי התמחות הרופא, 2009**

הרופא	סה"כ	אחוזים
רופא משפחה או רופא כללי <sup>(2)</sup>	30.6	
רופא פנימי <sup>(3)</sup>	42.8	
רופא עור ומין	11.7	
רופא אורתופד	19.3	
רופא קרדיולוג	43.7	
רופא נשים	2.9	
רופא אורולוג	41.7	
רופא אף אוזן גרון	16.6	
רופא נוירולוג	28.7	
רופא כירורג	21.3	
רופא עיניים	32.2	
רופא ריאות	29.7	
רופא פסיכיאטר	13.8	

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל ייעוץ טלפוני
2. כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים, מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
3. רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או במרפאת בית חולים

לוח 2.28: בני 65+ וכלל האוכלוסייה<sup>(1)</sup> המדווחים על ביצוע בדיקות רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 2010

אחוזים

מועד ביצוע הבדיקה האחרונה <sup>(2)</sup>				עשו בדיקה	מאפיינים
סה"כ	מעל שנתיים	מעל שנה ועד שנתיים	בשנה אחרונה		
<b>בדיקת דם</b>					
100.0	(0.9)	2.9	96.2	<b>98.9</b>	סה"כ בני 65+
100.0	..	3.2	95.9	<b>98.4</b>	גברים
100.0	1.0	2.6	96.3	<b>99.3</b>	נשים
100.0	8.2	11.4	79.8	<b>89.6</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(1)</sup>
<b>בדיקת כולסטרול</b>					
100.0	1.1	4.1	94.8	<b>95.7</b>	סה"כ בני 65+
100.0	1.3	4.2	94.5	<b>95.1</b>	גברים
100.0	0.9	4.0	95.1	<b>96.1</b>	נשים
100.0	6.1	11.4	82.5	<b>71.3</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(1)</sup>
<b>בדיקת שומות ונקודות חן</b>					
100.0	18.0	21.0	60.2	<b>21.6</b>	סה"כ בני 65+
100.0	16.1	21.6	62.4	<b>23.7</b>	גברים
100.0	21.4	20.5	58.1	<b>20.0</b>	נשים
100.0	30.9	20.4	48.7	<b>20.8</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(1)</sup>
<b>בדיקת ממוגרפיה</b>					
100.0	27.2	26.7	46.2	<b>82.7</b>	נשים בנות +65
100.0	19.0	28.0	53.0	<b>70.3</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(3)</sup>
<b>בדיקת פרוסטטה</b>					
100.0	20.3	18.3	61.4	<b>53.4</b>	גברים בני 65+
100.0	18.5	18.5	63.0	<b>38.8</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(4)</sup>

←

**לוח 2.28: בני 65+ וכלל האוכלוסייה<sup>(1)</sup> המדווחים על ביצוע בדיקות רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 2010 (המשך)**

אחוזים

מועד ביצוע הבדיקה האחרונה <sup>(2)</sup>				עשו בדיקה	מאפיינים
סה"כ	מעל שנתיים	מעל שנה ועד שנתיים	בשנה אחרונה		
<b>בדיקת דם סמוי</b>					
100.0	20.1	20.8	59.1	<b>57.1</b>	סה"כ בני 65+
100.0	18.0	21.1	60.9	<b>60.2</b>	גברים
100.0	22.0	20.6	57.4	<b>54.7</b>	נשים
100.0	15.8	20.4	63.8	<b>51.7</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(1)</sup>
<b>בדיקת קולונוסקופייה</b>					
100.0	27.8	33.8	30.6	<b>43.6</b>	סה"כ בני 65+
100.0	22.5	22.5	22.5	<b>46.6</b>	גברים
100.0	49.7	43.8	46.9	<b>41.2</b>	נשים
100.0	44.1	23.4	32.5	<b>36.5</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(5)</sup>

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה
2. מתוך אלה שעשו את הבדיקה
3. לנשים בנות 40 ומעלה
4. לגברים בני 50 ומעלה
5. לבני 50 ומעלה

**לוח 2.29: בני 65+ וכלל האוכלוסייה\* אשר קיבלו חיסון נגד שפעת לפי גיל ומין, 2010**

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>57.0</b>	<b>60.0</b>	<b>54.6</b>
<b>גיל</b>			
בני 65-74	52.9	57.1	49.7
בני 75+	62.1	63.8	60.7
כלל האוכלוסייה	22.9	23.5	22.3

מקור: למ"ס, הסקר החברתי \* בני 20 ומעלה

**לוח 2.30: בני 65+ וכלל האוכלוסייה\* אשר עברו בדיקה, טיפול או ניקוי שיניים בשנה האחרונה, לפי גיל ומין, 2010**

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>עברו בדיקה או טיפול שיניים</b>			
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>38.3</b>	<b>37.7</b>	<b>38.8</b>
<b>גיל</b>			
בני 65-74	42.3	41.9	42.6
בני 75+	33.3	32.2	34.0
כלל האוכלוסייה	49.8	47.9	51.7
<b>עברו ניקוי שיניים</b>			
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>29.1</b>	<b>29.6</b>	<b>28.7</b>
<b>גיל</b>			
בני 65-74	33.7	32.4	34.7
בני 75+	23.3	25.9	21.2
כלל האוכלוסייה	42.4	40.3	44.3

מקור: למ"ס, הסקר החברתי \* בני 20 ומעלה



**לוח 2.31: ביקורים וביקורים חוזרים של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה<sup>(1)</sup>, לפי גיל ומין, 2016**

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>מספר ביקורים<sup>(2)</sup> (באלפים)</b>			
סה"כ בני 65+ גיל	562.7	261.9	300.8
בני 65-74 גיל	229.6	117.1	112.5
בני 75-84 גיל	205.7	92.6	113.1
בני 85+ גיל	127.4	52.2	75.2
כלל האוכלוסייה	2,588.8	1,320.3	1,268.5
<b>אחוז הביקורים של בני 65+ מתוך כלל הביקורים</b>	<b>21.7</b>	<b>19.8</b>	<b>23.7</b>
<b>שיעורים לאלף נפש</b>			
סה"כ בני 65+ גיל	575	604	552
בני 65-74 גיל	424	462	390
בני 75-84 גיל	702	744	671
בני 85+ גיל	1,049	1,152	988
כלל האוכלוסייה	303	315	291
<b>ביקורים חוזרים<sup>(3)</sup> בתוך 30 ימים (אחוזים)</b>			
סה"כ בני 65+ גיל	22.1	22.8	17.2
בני 65-74 גיל	20.9	21.9	15.0
בני 75-84 גיל	22.8	23.5	18.1
בני 85+ גיל	23.1	23.7	19.2
כלל האוכלוסייה	17.2	19.1	11.3

מקור: מקור: "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה - מאפייני הפעילות 2016" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)

1. חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של 28 בתי חולים לאשפוז כללי ללא בתי החולים במזרח ירושלים. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום
2. מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל ביקורים עקב לידה
3. ביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה

לוח 2.32: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על אשפוז בבית חולים<sup>(1)</sup>, לפי גיל ומין, 2009

אחוזים				
מאפיינים	65+	74-65	75+	כלל האוכלוסייה
סה"כ	19.0	16.2	22.3	5.9
מין				
גברים	19.3	17.3	21.8	5.9
נשים	18.7	15.4	22.6	5.9
קבוצת אוכלוסייה				
יהודים ואחרים <sup>(2)</sup>	18.5	15.4	22.0	5.8
ערבים	24.3	23.4	26.5	6.4

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. אשפוז בשנים עשר החודשים הקודמים לריאיון, לא כולל אשפוז יום, אשפוז ללידה, אשפוז בבית חולים כרוני וניתוחים קוסמטיים
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

**לוח 2.33: אשפוזים\* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי, לפי מין וגיל, שנים נבחרות**

שיעורים ל-1,000 נפש

מאפיינים	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2005	2000
<b>בני 65+</b>								
סה"כ	418	429	432	442	460	493	498	494
גברים	475	487	488	500	520	556	568	570
נשים	373	383	388	397	413	446	446	437
<b>בני 65-74</b>								
סה"כ	306	312	316	325	339	367	380	397
גברים	362	369	373	383	400	431	447	468
נשים	256	262	266	275	287	312	326	342
<b>בני 75+</b>								
סה"כ	564	574	572	579	598	632	637	617
גברים	640	651	645	654	675	710	726	710
נשים	510	520	522	527	546	579	577	553
<b>בני 75-84</b>								
סה"כ	505	513	513	525	543	577	581	569
גברים	583	594	587	602	622	654	673	661
נשים	447	452	458	469	485	522	519	503
<b>בני 85+</b>								
סה"כ	705	723	718	713	737	774	834	770
גברים	798	812	807	803	823	870	924	877
נשים	650	671	665	659	685	716	777	703
<b>כלל האוכלוסייה</b>								
סה"כ	135	136	137	139	141	147	147	144
גברים	130	132	132	135	137	142	143	142
נשים	139	141	141	143	146	152	151	146

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות  
 \* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

**לוח 2.34: אשפוזים\* של בני 65+ במחלקות כלליות, מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות**

								אחוזים
2016	2015	2014	2013	2012	2010	2005	2000	מאפיינים
								<b>בני 65+</b>
<b>34.8</b>	<b>34.5</b>	<b>33.9</b>	<b>33.5</b>	<b>33.5</b>	<b>33.3</b>	<b>34.1</b>	<b>34.1</b>	<b>סה"כ</b>
36.5	36.0	35.2	34.6	34.5	33.8	34.2	34.0	גברים
33.3	33.1	32.8	32.4	32.6	32.8	34.0	34.1	נשים
								<b>בני 75+</b>
20.4	20.6	20.4	20.2	20.3	20.4	20.1	18.8	סה"כ
19.9	20.0	19.7	19.5	19.5	19.3	19.0	18.0	גברים
20.9	21.1	21.0	20.8	21.0	21.3	21.2	19.6	נשים
								<b>בני 85+</b>
7.5	7.5	7.4	7.1	7.2	7.0	5.8	5.7	סה"כ
6.6	6.6	6.5	6.3	6.2	6.2	5.1	5.1	גברים
8.3	8.4	8.2	7.9	8.0	7.7	6.4	6.3	נשים

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

\* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.35: בני 65+ מכלל המאושפזים, לפי מחלקות\*, שנים נבחרות

אחוזים

מחלקה	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016
כלל המחלקות הכלליות	34.1	34.1	33.3	33.5	33.5	33.9	34.5	34.8
פנימית	58.0	58.9	59.0	60.2	60.1	60.7	61.5	62.0
ריאות	46.1	47.6	47.5	49.5	50.9	52.8	51.8	51.8
גריאטרייה חריפה	96.1	97.9	95.8	96.5	98.8	98.9	98.6	99.2
נירולוגיה	33.9	33.7	32.1	33.8	34.8	35.4	36.1	37.1
אונקולוגיה	37.9	42.1	38.2	40.6	40.5	41.6	43.6	46.5
עור ומין	32.1	32.6	35.0	33.2	32.9	35.7	37.8	38.6
השתלת מוח עצם	3.6	9.2	8.5	15.0	16.0	15.7	16.6	20.4
טיפול נמרץ כללי	47.6	49.9	48.9	48.5	47.7	47.7	49.4	48.0
טיפול נמרץ לב	50.4	50.4	49.4	50.7	51.0	51.3	52.4	53.6
טיפול נמרץ נשימתי	73.9	72.7	71.2	62.9	57.8	57.4	61.1	59.3
כירורגייה כללית	27.2	27.8	27.2	26.8	27.1	27.7	28.9	29.9
אורתופדיה	32.4	34.5	35.2	35.7	35.6	36.0	36.8	36.7
אורולוגיה	40.3	40.9	37.9	40.1	40.7	40.6	41.4	42.6
נירוכירורגייה	28.8	30.3	33.7	35.2	34.7	36.6	37.3	37.3
כירורגייה חזה ולב	47.4	47.4	47.6	48.4	48.2	47.7	48.1	49.3
כירורגייה כלי דם	55.8	57.6	53.7	55.2	54.2	53.7	56.1	56.4
כירורגייה פלסטית	28.1	28.4	27.3	26.4	26.8	26.4	27.0	27.1
עיניים	58.4	59.3	61.0	59.3	59.3	58.2	57.6	57.8
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	11.9	12.3	13.0	13.4	14.6	14.1	14.4	14.6
פה ולסת	11.6	11.5	10.5	11.9	13.5	12.9	11.4	13.2
נשים	3.9	3.7	3.1	3.5	3.6	3.5	3.6	4.0
השהיה	36.2	28.9	31.9	28.2	23.3	24.0	22.1	20.7

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

\* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכלל בת החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.36: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2016

			אחוזים
מחלקה	סה"כ	גברים	נשים
כלל המחלקות הכלליות*	100.0	100.0	100.0
פנימית	46.9	45.8	48.1
ריאות	0.3	0.4	0.3
גריאטרייה חריפה	3.9	3.0	4.7
נירולוגיה	1.9	2.0	1.8
אונקולוגיה	1.3	1.5	1.1
עור ומין	0.5	0.6	0.5
השתלת מוח עצם	0.1	0.1	0.1
טיפול נמרץ כללי	2.1	2.3	1.9
טיפול נמרץ לב	4.1	4.9	3.2
טיפול נמרץ נשימתי	0.2	0.2	0.2
כירורגייה כללית	15.8	16.4	15.1
אורתופדיה	5.8	4.2	7.4
אורולוגיה	3.8	6.1	1.5
נירוכירורגייה	1.0	1.1	0.9
כירורגייה חזה ולב	1.6	2.0	1.2
כירורגייה כלי דם	1.2	1.6	0.8
כירורגייה פלסטית	0.6	0.6	0.6
עיניים	3.6	3.3	3.9
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	1.1	1.2	1.0
פה ולסת	0.1	0.1	0.1
נשים	1.1	0.0	2.2
השהיה	2.9	2.5	3.3

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

\* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.37: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2016

ימים

מחלקה	כלל האוכלוסייה			בני 65+		סה"כ
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	
<b>כלל המחלקות הכלליות*</b>	3.8	4.2	4.0	5.3	5.2	<b>5.3</b>
פנימית	4.8	4.5	4.6	5.2	5.1	<b>5.1</b>
ריאות	4.8	4.4	4.6	5.2	4.3	<b>4.7</b>
גריאטרייה חריפה	10.3	10.1	10.2	10.3	10.2	<b>10.2</b>
נירולוגיה	5.1	5.3	5.2	6.6	6.5	<b>6.5</b>
אונקולוגיה	6.9	6.4	6.6	7.8	6.8	<b>7.2</b>
עור ומין	6.7	6.6	6.6	8.2	6.9	<b>7.5</b>
השתלת מוח עצם	16.3	17.5	17.0	13.3	15.1	<b>14.3</b>
טיפול נמרץ כללי	5.7	6.0	5.9	6.5	6.5	<b>6.5</b>
טיפול נמרץ לב	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	<b>2.7</b>
טיפול נמרץ נשימתי	3.3	2.6	2.9	4.0	2.6	<b>3.3</b>
כירורגייה כללית	2.6	2.6	2.6	3.7	3.4	<b>3.5</b>
אורתופדיה	5.1	4.7	4.9	6.3	6.6	<b>6.5</b>
אורולוגיה	3.4	3.3	3.3	3.9	3.9	<b>3.9</b>
נירוכיורגייה	6.2	6.6	6.4	6.7	7.0	<b>6.8</b>
כירורגייה חזה ולב	6.3	6.4	6.4	6.4	6.7	<b>6.6</b>
כירורגייה כלי דם	3.9	4.8	4.5	4.3	5.1	<b>4.8</b>
כירורגייה פלסטית	4.4	5.6	4.9	5.4	4.4	<b>4.9</b>
עיניים	1.9	2.1	2.0	1.8	1.8	<b>1.8</b>
אף-אוזן-גרון						
וכירורגייה ראש וצוואר	2.7	2.6	2.6	3.7	3.8	<b>3.7</b>
פה ולסת	3.4	3.8	3.6	4.4	5.3	<b>4.9</b>
נשים	2.1	1.1	2.1	3.3	1.2	<b>3.2</b>
השהיה	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	<b>1.2</b>

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות  
 \* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

**לוח 2.38: בני +65 וכלל האוכלוסייה, המטופלים\* בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי במרפאות ממשלתיות, 2016**

סוף שנה

סה"כ	
<b>מספרים מוחלטים</b>	
<b>מטופלים בני +65</b>	<b>5,934</b>
מטופלים בכלל האוכלוסייה	48,549
<b>אחוזים</b>	
בני +65 מכלל המטופלים	12.2
מטופלים בני +65 מכלל בני +65	0.6
כלל המטופלים מתוך האוכלוסייה	0.6

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה \* אנשים שהיה להם לפחות מגע אחד בתקופה הנתונה

**לוח 2.39: בני +65 וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2016**

מספרים מוחלטים, סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
<b>בני +65</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
בני 65-74	14	6	8
בני 75-84	3	1	2
בני 85+	0	0	0
כלל האוכלוסייה	220	119	101

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה



לוח 2.40: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מלא, לפי גיל ומין, 2016

סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
<b>מספרים מוחלטים</b>			
<b>כלל בני 65+</b>	<b>343</b>	<b>170</b>	<b>173</b>
בני 65-74	246	138	108
בני 75-84	89	29	60
בני 85+	8	3	5
כלל האוכלוסייה	3,331	2,196	1,135
<b>שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה</b>			
<b>כלל בני 65+</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>
בני 65-74	0.4	0.5	0.4
בני 75-84	0.3	0.2	0.4
בני 85+	0.1	0.1	0.1
כלל האוכלוסייה	0.4	0.5	0.3

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

**לוח 2.41: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות**

שיעורים ל-1,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	1990	2000	2005	2009	2015	2016
<b>כלל בני 65+</b>						
סה"כ	3.5	1.5	0.7	0.4	0.4	0.4
גברים	3.1	1.4	0.7	0.4	0.4	0.5
נשים	3.9	1.5	0.8	0.3	0.3	0.4
<b>בני 65-74</b>						
סה"כ	3.6	1.7	0.9	0.5	0.5	0.4
גברים	3.7	1.7	0.9	0.5	0.6	0.5
נשים	3.5	1.6	0.9	0.5	0.4	0.4
<b>בני 75-84</b>						
סה"כ	3.6	1.3	0.6	0.3	0.2	0.3
גברים	2.3	1.0	0.5	0.3	0.2	0.2
נשים	4.5	1.5	0.7	0.3	0.3	0.4
<b>בני 85+</b>						
סה"כ	3.1	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1
גברים	1.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1
נשים	4.0	1.2	0.3	0.1	0.1	0.1
<b>כלל האוכלוסייה</b>						
סה"כ	1.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4
גברים	2.1	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5
נשים	1.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

**לוח 2.42: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות**

מספרים מוחלטים

מאפיינים	1990	2000	2005	2010	2015	2016
<b>כלל בני 65+</b>						
סה"כ	1,412	1,867	1,746	1,645	1,949	2,132
גברים	526	641	628	758	913	1,012
נשים	886	1,226	1,118	887	1,036	1,120
<b>בני 65-74</b>						
סה"כ	892	1,117	1,072	1,005	1,287	1,427
גברים	321	408	387	497	636	734
נשים	571	709	685	508	651	693
<b>בני 75-84</b>						
סה"כ	467	621	567	540	539	586
גברים	181	186	203	214	221	222
נשים	286	435	364	326	318	364
<b>בני 85+</b>						
סה"כ	53	129	107	100	123	119
גברים	24	47	38	47	56	56
נשים	29	82	69	53	67	63
<b>כלל האוכלוסייה</b>						
סה"כ	12,262	18,172	20,892	20,918	22,515	23,379
גברים	6,788	10,632	12,605	13,095	13,999	14,399
נשים	5,474	7,540	8,287	7,823	8,516	8,980

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

**לוח 2.43: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2016**

כלל האוכלוסייה	בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+	אבחנה
<b>מספרים מוחלטים</b>					
<b>סה"כ קבלות</b>					
23,379	119	586	1,427	2,132	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
11,513	19	147	625	791	הפרעות פסיכוטיות חריפות
1,813	8	27	56	91	הפרעות אפקטיביות
3,754	29	259	524	812	הפרעות אורגניות
636	47	101	69	217	הפרעות נירוטיות
1,572	10	22	53	85	הפרעות אישיות
1,054		3	28	31	הפרעות בגיל הילדות
419			2	2	סמים ואלכוהול
826		2	13	15	פיגור שכלי
133			4	4	גורמי פנייה אחרים
1,587	5	25	48	78	לא ידוע
72	1		5	6	
<b>אחוזים</b>					
<b>סה"כ קבלות</b>					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
49.2	16.0	25.1	43.8	37.1	הפרעות פסיכוטיות חריפות
7.8	6.7	4.6	3.9	4.3	הפרעות אפקטיביות
16.1	24.4	44.2	36.7	38.1	הפרעות אורגניות
2.7	39.5	17.2	4.8	10.2	הפרעות נירוטיות
6.7	8.4	3.8	3.7	4.0	הפרעות אישיות
4.5	0.0	0.5	2.0	1.5	הפרעות בגיל הילדות
1.8	0.0	0.0	0.1	0.1	סמים ואלכוהול
3.5	0.0	0.3	0.9	0.7	פיגור שכלי
0.6	0.0	0.0	0.3	0.2	גורמי פנייה אחרים
6.8	4.2	4.3	3.4	3.7	לא ידוע
0.3	0.8	0.0	0.4	0.3	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.44: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2016

גיל	סה"כ	גברים	נשים
<b>מספרים מוחלטים</b>			
<b>כלל בני 65+</b>	<b>544</b>	<b>267</b>	<b>277</b>
בני 65-74	279	144	135
בני 75-84	189	83	106
בני 85+	76	40	36
כלל האוכלוסייה	5,071	3,003	2,068
<b>שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה</b>			
<b>כלל בני 65+</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>
בני 65-74	0.5	0.6	0.5
בני 75-84	0.6	0.7	0.6
בני 85+	0.6	0.9	0.5
כלל האוכלוסייה	0.6	0.7	0.5

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

**לוח 2.45: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות**

אחוזים

					מאפיינים				
					בני 65+	בני 74-65	בני 84-75	בני 85+	כלל האוכלוסייה
<b>נובמבר 2005</b>									
					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סה"כ									
					69.3	65.9	72.4	75.6	53.9
שירותי בריאות כללית									
					16.6	18.8	14.4	12.5	24.1
מכבי שירותי בריאות									
					7.7	8.0	7.4	6.7	9.9
קופת חולים לאומית									
					6.5	7.3	5.7	5.3	12.1
קופת חולים מאוחדת									
<b>נובמבר 2010</b>									
					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סה"כ									
					66.0	62.1	69.3	73.1	52.5
שירותי בריאות כללית									
					18.8	21.4	16.7	14.1	24.7
מכבי שירותי בריאות									
					7.4	7.6	7.3	6.8	9.2
קופת חולים לאומית									
					7.8	8.9	6.7	6.0	13.6
קופת חולים מאוחדת									
<b>נובמבר 2015</b>									
					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סה"כ									
					61.1	57.8	63.4	70.2	52.3
שירותי בריאות כללית									
					22.2	24.4	20.9	16.2	25.2
מכבי שירותי בריאות									
					7.4	7.5	7.4	6.8	8.7
קופת חולים לאומית									
					9.3	10.4	8.3	6.8	13.8
קופת חולים מאוחדת									
<b>נובמבר 2016</b>									
					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סה"כ									
					60.4	57.3	62.4	69.6	52.2
שירותי בריאות כללית									
					22.8	24.7	21.7	16.7	25.4
מכבי שירותי בריאות									
					7.3	7.4	7.3	6.7	8.5
קופת חולים לאומית									
					9.5	10.5	8.6	7.0	13.9
קופת חולים מאוחדת									

מקור: המוסד לביטוח לאומי

**לוח 2.46: בני 65+ מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, 1994-2016**

אחוזים

מועד	סה"כ	שירותי בריאות כללית	מכבי שירותי בריאות	קופת חולים לאומית	קופת חולים מאוחדת
דצמבר 1994	10.2	13.1	4.9	7.2	4.1
דצמבר 1995	10.1	12.9	5.1	7.4	4.4
נובמבר 1996	10.0	13.0	5.2	7.3	4.4
נובמבר 1997	10.1	13.2	5.4	7.2	4.4
נובמבר 1998	10.0	13.2	5.5	7.4	4.6
נובמבר 1999	10.0	13.1	5.6	7.4	4.7
נובמבר 2000	10.0	13.1	5.8	7.5	4.8
נובמבר 2001	10.0	13.1	6.0	7.5	5.0
נובמבר 2002	10.1	13.1	6.3	7.7	5.2
נובמבר 2003	10.2	13.2	6.6	7.9	5.3
נובמבר 2004	10.2	13.2	6.8	8.0	5.4
נובמבר 2005	10.2	13.1	7.0	7.9	5.5
נובמבר 2006	10.4	13.2	7.3	8.0	5.8
נובמבר 2007	10.1	12.9	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2008	10.1	12.8	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2009	10.1	12.8	7.5	8.1	5.6
נובמבר 2010	10.2	12.8	7.7	8.2	5.8
נובמבר 2011	10.0	12.6	7.6	8.2	5.8
נובמבר 2012	10.7	13.0	8.7	8.7	6.7
נובמבר 2013	10.9	13.1	9.2	9.1	7.0
נובמבר 2014	11.1	13.1	9.7	9.2	7.3
נובמבר 2015	11.4	13.3	10.1	9.6	7.7
<b>נובמבר 2016</b>	<b>11.7</b>	<b>13.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.1</b>	<b>8.0</b>

מקור: המוסד לביטוח לאומי

