


מאפיינים בריאותיים
של בני 65+ ודפוסי שימוש
בשירותי בריאות נבחרים

2. מאפיינים בריאותיים של בני 65+ ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של בני 65+ בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של בני 65+ אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד להתנהגות בריאותית ובשמירה על בריאותם.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של בני 65+ ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשה באיכות חייו של האדם. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של בני 65+ ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, סגנון חיים, מחלות, מוגבלות ותמותה, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. עוד מובאים נתונים על דפוסי השימוש של בני 65+ בשירותי הבריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

- ◆ **תוחלת החיים בלידה** הגיעה בשנת 2018 ל-84.8 שנים לנשים ול-80.9 שנים לגברים. תוחלת החיים של יהודים ואחרים גבוהה מזו של הערבים: בשנת 2018 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 3.5 שנים לגברים ו-2.9 שנים לנשים (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** בשנים 2014-2018 היא 21.7 שנים לנשים ו-19.3 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 86.7 בממוצע, וגבר – עד גיל 84.3. תוחלת החיים בגיל 65 של יהודים גבוהה מזו של ערבים (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 13.5 שנים ולגברים 12 שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת החיים של גברים בני 75 ב-3.5 שנים ושל נשים בנות 75 ב-4.3 שנים (לוח 2.3).
- **היישוב שבו תוחלת החיים בלידה** היא הגבוהה ביותר (מבין היישובים שבהם 50,000 תושבים ויותר) הוא מודיעין עילית – 87.6 שנים. היישובים שבהם תוחלת החיים הגבוהה ביותר הם מודיעין עילית, הוד השרון, מודיעין-מכבים-רעות, גבעתיים ורעננה. היישובים שבהם תוחלת החיים הנמוכה ביותר הם רמלה, נצרת, לוד, אילת ואום אל-פחם (79 שנים) (לוח 2.4).
- ◆ ב-2017 עמד **שיעור הפטירה** המתוקן לגיל ל-1,000 בני 65+ על 43 בקרב הגברים ועל 32 בקרב הנשים. שיעור הפטירה המתוקן ל-1,000 בני 65+ בקרב הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים: 51 בקרב הגברים ו-39 בקרב הנשים (לוח 2.5).
- בשנת 2017 שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי ישראל היה 34, בקרב ילידי אסיה 40, בקרב ילידי אפריקה 35 ובקרב ילידי אירופה-אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) 45. שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי בריה"מ לשעבר הוא 41 (לוח 2.6).
- 64.4% מבני 65+ **נפטרו בבית חולים** בשנת 2018, שיעור דומה לזה שבקרב בני 0-64 (64.1%). בקרב בני 65+ 66% מהגברים ו-63.1% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 61.1% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 69.3% מהנשים. יש לשים לב כי הנתונים אינם

כוללים את כל בתי החולים למחלות ממושכות ולכן יתכן שהנתונים, במיוחד לגבי בני 65+, מוטים כלפי מטה (לוח 2.7).

- **סיבת הפטירה העיקרית**, הן בקרב בני 65+ והן בכלל האוכלוסייה, היא שאתות ממאירות. בקרב בני 65+ סיבות עיקריות נוספות הן מחלות לב, מחלות זיהומיות, סוכרת מחלות של כלי דם במוח (לוח 2.8).

- ב-2017 נפטרו 36,441 אנשים בגיל 65+, שהם 81.7% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. עם השנים חלקם של בני 65-74 בכלל הפטירות של בני 65+ הולך ופוחת. בשנת 2003 היה חלקם של בני 65-74 מתוך הפטירות של בני 65+ 23% לעומת 20% ב-2017 (לוח 2.10) ונתונים משנתונים קודמים).

- עם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב, לחץ-דם ומחלות כלי דם (יתר לחץ-דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם) בסיבות הפטירה: מ-18.8% בקרב בני 65-74 ל-29.4% בקרב בני 85+. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-37.8% בקרב בני 65-74 ל-14.6% בקרב בני 85+ (לוח 2.10 א).

♦ בשנת 2016 נרשמו 72 **התאבדויות** של גברים בני 65+ ו-11 התאבדויות של נשים בנות 65+. אחוז ההתאבדויות של בני 65+ מכלל ההתאבדויות באוכלוסייה ירד מ-30.8% ב-1981 ל-18.6% ב-2014 וב-2016 עמד על 21.3% (לוח 2.11).

♦ על פי הסקר החברתי, 56.5% מבני 65+ מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד** (נתון ממוצע לתקופה 2016-2018). בקרב בני 65+, 61.4% מהגברים ו-52.6% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 12.5% מבני 65+ ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל-לא-טוב (לוח 2.12).

♦ על פי הסקר החברתי, בשנת 2017 49.3% מבני 65+ **עוסקים בפעילות גופנית**. מתוך בני 65+ העוסקים בפעילות גופנית, 79.1% עוסקים בפעילות גופנית מתונה ו-20.4% עוסקים בפעילות גופנית מאומצת. 29.4% עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק השרירים (לוח 2.13).

- ◆ **מדד מסת הגוף (BMI)** מחושב על-פי גובה ומשקל. ערכים שמעל 30 נחשבים להשמנת יתר. על פי הסקר החברתי של 2017 ל-23.1% מבני 65 ומעלה יש BMI של 30 ויותר (לפי דיווח עצמי על גובה ומשקל גוף). בקרב בני 65+ 24.4% מהנשים סובלות מהשמנת יתר, ו-21.9% מהגברים. בקרב הערבים 36.4% סובלים מהשמנת יתר לעומת 21.9% בקרב יהודים ואחרים. אחוז הנשים הערביות הסובלות מהשמנת יתר גבוה במיוחד, 40.8% (לוח 2.14).
- ◆ על פי הסקר החברתי של 2017 11.1% מבני 65+ **מעשנים** כיום, בתדירות כלשהי. אחוז המעשנים בקרב הגברים בני 65+, כפול מאחוז הנשים בנות 65+ המעשנות (14.9% לעומת 8%). 36% מבני 65+ עישנו בעבר והפסיקו. מבין המעשנים שהפסיקו 31% עשו זאת בגיל 60 ומעלה (לוח 2.15).
- ◆ על פי הסקר החברתי, בשנת 2017 54.3% מבני 65+ מדווחים על **קושי כלשהו להירדם** או לישון במשך לילה שלם. 50.3% אחוזים מבני 65-74 מדווחים על קושי מסוג זה ו-60.8% מבני 75+. מבין אלה שדיווחו על בעיות שינה 72.1% מבני 65+ דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום (לוח 2.16).
- ◆ בשנת 2017 נרשמו 14,211 **מקרים חדשים של שִׁאתות ממאירות** בקרב בני 65+, אשר מהווים 1,625 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים בני 65+ גבוה יותר מאשר בקרב הנשים בנות 65+ (1,906 לעומת 1,400 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.17).
- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שִׁאתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים: 1,926 לעומת 1,700 לכל 100,000 נפש. גם שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,443 לעומת 916 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.18). בשנת 2017 שיעור המקרים החדשים בקרב יהודים ילידי אירופה-אמריקה היה גבוה מאשר בקרב יהודים ילידי אסיה, אפריקה או ישראל, בקרב גברים ונשים (לוח 2.19).

◆ לפי נתוני הסקר החברתי, (ממוצע לתקופה 2016-2018), אומדן בני 65+ הגרים בקהילה ומוגבלים **בביצוע** (מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע) פעולות הקשורות למשק הבית (כגון נקיון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית) עומד על 25.4 אלף איש והם מהווים 25.5% מבני 65+ הגרים בקהילה. שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 16.4% בקרב בני 65-74 לעומת 40.4% בקרב בני 75+. מספרם של בני 65+ המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב-283 אלף איש (28.3% מבני 65+ הגרים בקהילה). שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 65-74 עומד על 19.6% ובקרב בני 75+ על 42.3%. מספר בני 65+ המוגבלים בביצוע פעולות מתחום הטיפול האישי, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב-119 אלף איש והם מהווים 11.9% מבני 65+ הגרים בקהילה (6.8% בקרב בני 65-74 ו-20.4% בקרב בני 75+). 75 אלף איש מוגבלים בראייה ו-86 אלף איש בשמיעה בקרב בני 65+ (7.6% ו-8.7% בהתאמה). שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו גבוה בקרב הערבים לעומת היהודים ואחרים. למשל, 53.7% בקרב הערבים מוגבלים בביצוע פעולות הקשורות למשק הבית לעומת 22.9% בקרב יהודים ואחרים (לוח 2.21).

◆ בשנת 2018 נפגעו **בתאונות דרכים** 2,414 בני 65+. מתוכם, 78 נהרגו (3.2% מבני 65+ שנפגעו), 433 נפצעו קשה (17.9%) ו-1,903 נפצעו קל (78.8%). 33.1% מבני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 43.2% נהגו ברכב ו-20% נסעו ברכב (לוח 2.22).

- שיעור בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2018 עומד על 233 ל-100,000 נפש ושיעור ההרוגים מקרבם הוא 8 ל-100,000 נפש. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב בני 65+ (לוח 2.23). שיעור בני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים ושיעור ההרוגים מתוכם היו בתהליך ירידה מאז שנות התשעים ובעשור האחרון נמצאים במגמה לא אחידה (לוח 2.24).

- שיעור הנהגים בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2018 הוא 46 ל-10,000 נהגים. בסה"כ היו 2,451 נהגים בני 65+ מעורבים בתאונות מתוכן 58 תאונות קטלניות (לוח 2.25).

- ◆ לפי הסקר החברתי של 2017 91.8% מהנשים בנות 65+ עשו בדיקת ממוגרפיה, מהן 40.6% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה. 52.4% מהנשים בנות 65+ עשו בדיקת צוואר הרחם, 18.9% מהן בשנה האחרונה. 71.8% מבני 65+ עשו בדיקת דם סמוי. 57.9% מבני 65+ עשו בדיקת קולונסקופייה, 60.4% מהגברים ו-55.8% מהנשים (לוח 2.26).
- ◆ לפי הסקר החברתי, בשנת 2017, 60.8% מבני 65+ קיבלו חיסון נגד שפעת, 62.7% מהגברים ו-59.3% מהנשים. עם העלייה בגיל עולה שיעור מקבלי החיסון: 58.2% בקרב בני 65-74 לעומת 65.1% בקרב בני 75+ (לוח 2.27).
- ◆ מתוך כלל הביקורים במחלקות לרפואה דחופה (חדרי מיון) בשנת 2018, 22.7% היו של בני 65+. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 420.4 בקרב בני 65-74; 701.1 בקרב בני 75-84 ו-1,043.7 בקרב בני 85+. 22.5% מהביקורים של בני 65+ היו ביקורים חוזרים (ביקורים חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) (לוח 2.28).
- ◆ שיעורי האשפוז של בני 65+ במחלקות האשפוז הכלליות בשנת 2018 היו 404 אשפוזים ל-1,000 בני 65+. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-298 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-703 בגיל 85+). מאז שנת 2000 נמצאים שיעורי האשפוז של בני 65+ במגמת ירידה (לוח 2.29).
- בבחינת שיעור האשפוז של בני 65+ מכלל האשפוזים נמצא כי בשנת 2018 35.4% מהאשפוזים היו של בני 65+ (המהווים כ-11.6% מכלל האוכלוסייה), ו-20% מהאשפוזים היו של בני 75+ (המהווים כ-4.8% מכלל האוכלוסייה); (לוח 2.30). חלקם של בני 65+ מתוך כלל האשפוזים במחלקות פנימית, טיפול נמרץ נשימתי, כירורגיה כלי דם ועיניים גבוה במיוחד (ללא גריאטרייה); (לוח 2.31).
- התפלגות האשפוזים של בני 65+ במחלקות האשפוז מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה 45.1% מהאשפוזים (לוח 2.32).
- השהייה הממוצעת של בני 65+ בכלל המחלקות הכלליות בשנת 2018 הייתה 5.2 ימים. המחלקות שבהן משך השהייה של בני 65+ הוא הארוך

ביותר הן השתלת מוח עצם, גריאטרייה חריפה, עור ומין, ואונקולוגיה (לוח 2.33).

♦ בשנת 2018 קיבלו 5,306 בני 65+ (פחות מ-1% מקרב בני 65+) טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי. בני 65+ מהווים 12.2% מכלל המטופלים בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי ב-2018 (לוח 2.34).

♦ ב-2018 היו 10 בני 65+ באשפוז יום פסיכיאטרי, והם היוו 5% מסך השוהים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי. כמעט כל המאושפזים באשפוז יום הם בני 65-74: 80% מכלל בני 65+ השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.35).

♦ בסוף 2018 היו 329 בני 65+ מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, שיעור של 0.3 מאושפזים ל-1,000 נפש (שיעור דומה לשיעור המאושפזים בקרב כלל האוכלוסייה). עשרה אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.36). משנת 1990 ועד שנת 2018 חלה ירידה בשיעור בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.3 ל-1,000 נפש); (לוח 2.37).

- במהלך 2018 היו 2,065 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+, ואלה היוו 8.7% מסך הקבלות לאשפוז. 56% מהקבלות של בני 65+ של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (68.8% מכלל האשפוזים של בני 65+); (לוח 2.38). שתי האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (74.5% מהקבלות) היו: הפרעות אפקטיביות וסכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות (לוח 2.39).

- 11% מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא בשנת 2018 היו של בני 65+ (לוח 2.40).

♦ בנובמבר שנת 2018 היו 59.2% מבני 65+ מבוטחים בשירותי בריאות כללית, 23.8% במכבי שירותי בריאות, 7.2% בקופת חולים לאומית ו-9.8% בקופת חולים מאוחדת. יש ירידה לאורך השנים באחוז בני 65+ המבוטחים בשירותי בריאות כללית. אחוז המבוטחים בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקנים המבוגרים יותר ועומד על 68.6% בקרב בני 85+ (לוח 2.41). 13.8% מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם בני 65+, 11.1%

במכבי שירותי בריאות, 10.6% בקופת חולים לאומית ו-8.6% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.42).

הגדרות והסברים

כלל האוכלוסייה: המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "ערבים" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ. עד שנת 2002 לא נכללו מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל. החל מ-2002 נכללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל פחות משנה.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אומדני המוגבלות בקרב בני 65+ הגרים בקהילה, מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בשנים 2016-2018 בסקר החברתי שנערך על ידי הלמ"ס.

רישום השאתות הממאירות נעשה על ידי הרישום הלאומי לסרטן במרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות וכולל גם גידולים ממוקדים וחדרניים.

דמנציה: הנתונים על שכיחות דמנציה באוכלוסייה מבוססים על 'סקר הימצאות' שנעשה על ידי המרכז הארצי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות, כחלק מפעולות התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות ומניעתן. הסקר נערך על ידי שליפת נתונים מהתיק הרפואי הממוחשב של מבוטחי קופה פעילים בשנת 2016, בני 45 ומעלה, בארבע קופות החולים, לפי 'הגדרת מקרה', על בסיס תיעוד של אבחנה או של רכישת תרופות הנמצא בתיק הרפואי. מבוטח הוגדר כחולה בדמנציה (אי-פעם) אם ענה לפחות על אחד משלושת התנאים האלה: 1. קיים בתיקו תיעוד אבחנה של דמנציה מתוך רשימת האבחנות הקבועות / פעילות / כרוניות לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9; 2. רופא מומחה (משפחה / פנימי / גריאטר / פסיכיאטר / נוירולוג) תיעד בתיקו קוד אבחנה של דמנציה לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9, בלפחות שתי אבחנות ביקור בתקופה של עד 12 חודשים (לצורך הגדרה כחולה, שני הביקורים יכולים להיות אצל רופאים שונים); 3. המבוטח רכש אי-פעם תרופות כנגד דמנציה.

שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-25%-50%. בהתאם לכך ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. משרד הבריאות עומד לפרסם דו"ח מלא בנושא זה בקרוב. לפרטים ראו ברשימת הביבליוגרפיה.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת **סך-כל המחלקות הכלליות** אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי השהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

אשפוז פסיכיאטרי: אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

אשפוז מלא: מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

אשפוז יום: מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

קבלות: קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

קבלות ראשונות: קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים
 .. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-30%
 () = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 15% ל-30%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומכון מאירס-ג'וינט-ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		שנה
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
ערבים		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		שנה
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000
77.8	74.5	81.6	77.7	81.2	77.3	2001
77.9	74.7	81.9	77.9	81.5	77.5	2002
78.2	74.9	82.2	78.1	81.8	77.6	2003
79.6	75.4	82.7	78.5	82.4	78.0	2004
78.6	74.9	82.6	78.7	82.2	78.2	2005
78.5	75.1	83.0	79.2	82.5	78.7	2006
78.8	75.2	82.8	79.2	82.4	78.7	2007
79.6	75.7	83.3	79.5	83.0	79.0	2008
80.8	76.4	83.7	80.1	83.3	79.6	2009
81.3	76.6	83.9	80.3	83.6	79.7	2010
81.0	76.4	83.8	80.5	83.5	79.9	2011
80.7	76.9	84.0	80.4	83.6	79.9	2012
80.9	78.0	84.3	80.7	83.9	80.3	2013
81.2	76.8	84.5	80.9	84.1	80.3	2014
81.1	76.9	84.5	80.7	84.1	80.1	2015
81.3	77.2	84.7	81.3	84.2	80.7	2016
81.9	77.5	85.0	81.2	84.6	80.6	2017
82.3	78.0	85.2	81.5	84.8	80.9	2018

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת החיים בגיל 65, לפי דת ומין

ערבים*		יהודים		כלל האוכלוסייה		שנים
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
17.2	16.6	18.6	16.4	18.5	16.4	1999-1995
17.2	16.0	19.8	17.7	19.7	17.5	2004-2000
17.8	16.1	20.7	18.6	20.5	18.4	2009-2005
19.1	17.0	21.4	19.3	21.2	19.0	2014-2010
19.5	17.2	21.9	19.6	21.7	19.3	2018-2014

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי
* עד 1995, בני דתות אחרות

לוח 2.3: תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין

שנים	בגיל 75		בגיל 80		בגיל 85		בגיל 95	
	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים
1979-1975	9.2	8.5	6.9	6.5	5.1	4.9
1984-1980	9.3	8.7	6.8	6.6	4.9	4.6
1989-1985	10.0	9.2	7.4	6.7	5.4	5.0
1994-1990	10.7	9.6	8.0	7.3	5.8	5.4
1999-1995	11.1	10.1	8.1	7.5	5.8	5.6
2004-2000	12.1	11.0	9.0	8.5	6.5	6.5
2009-2005	12.6	11.5	9.4	8.7	6.8	6.6
2014-2010	13.1	11.8	9.6	8.8	7.2	6.7	3.3	3.4
2018-2014	13.5	12.0	9.9	8.9

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: תוחלת החיים בלידה, ביישובים*, לפי מין, 2017-2013

נשים	גברים	סה"כ	יישוב
		87.6	מודיעין עילית
		86.0	הוד השרון
		85.9	מודיעין-מכבים-רעות
		85.0	גבעתיים
		84.8	רעננה
86.4	82.6	84.6	רמת גן
		84.5	כפר סבא
		84.0	הרצליה
85.7	81.8	83.8	רחובות
85.4	81.6	83.5	ראשון לציון
85.3	81.4	83.5	פתח תקווה
85.8	8.9	83.1	ירושלים
85.4	8.7	83.0	חיפה
84.6	81.2	83.0	בני ברק
		82.7	ביתר עילית
84.5	8.6	82.6	תל אביב-יפו
84.3	8.7	82.6	חולון
83.9	81.2	82.5	בית שמש
84.6	8.3	82.5	נתניה
84.1	79.5	81.9	אשדוד
		81.9	חדרה
84.0	79.5	81.8	אשקלון
		81.5	נהרייה
83.6	79.5	81.4	באר שבע
		81.1	קריית אתא
		81.0	קריית גת
83.3	78.4	81.0	בת ים
		80.9	רמלה
		80.4	נצרת
		80.3	לוד
		80.0	אילת
		79.0	אום אל-פחם

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי חברתי של יישובים בישראל, 2017-2011
 * יישובים שמנו מעל 50,000 תושבים בסוף 2016. ממויין לפי סדר יורד של תוחלת החיים

לוח 2.5: פטירות של בני 65+, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2017

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

גיל	סה"כ			יהודים ואחרים ⁽¹⁾			ערבים		
	סה"כ גברים	נשים	סה"כ	סה"כ גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	
בני 65+	37	40	34	36	39	34	43	34	
בני 65-69	10	13	8	10	13	7	19	12	
בני 70-74	17	21	13	15	20	12	33	21	
בני 75+	70	77	65	70	77	65	78	65	
בני 75-79	30	37	24	28	35	23	49	39	
בני 80-84	54	64	46	52	62	45	93	63	
בני 85+	140	153	132	140	154	132	136	124	
בני 85-89	104	119	95	104	119	95	125	101	
בני 90-95	180	203	168	180	204	168	176	175	
בני 95+	247	241	250	253	250	256	127	164	
שיעורים מתוקננים לבני 65+ ⁽²⁾	37	43	32	37	42	31	51	39	

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)

2. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל בשנת 2017

לוח 2.6: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2017

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

בני 75+		בני 65-74				65+	מאפיינים
80+	79-75	סה"כ	74-70	69-65	סה"כ		
102	32	75	18	11	14	40	סה"כ
113	40	82	24	14	18	44	גברים
95	26	69	14	9	11	37	נשים
114	44	80	25	12	16	34	סה"כ ילידי ישראל ⁽²⁾
130	51	89	32	15	21	38	גברים
103	38	72	19	10	13	30	נשים
93	28	67	16	10	13	40	סה"כ ילידי אסיה
104	34	74	19	13	16	44	גברים
85	23	61	13	7	10	37	נשים
92	30	65	17	10	14	35	סה"כ ילידי אפריקה
98	38	71	23	14	18	40	גברים
87	24	60	12	7	10	32	נשים
104	29	78	15	11	13	45	סה"כ ילידי אירופה-אמריקה
115	38	87	20	14	16	49	גברים
98	23	73	12	8	10	43	נשים
97	30	69	16	12	14	41	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
109	41	78	23	16	18	46	גברים
91	23	63	12	9	10	37	נשים

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.7: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
2010			
בני 65+	68.2	69.7	66.9
בני 65-74	71.5	70.8	72.2
בני 75+	67.5	69.4	66.0
בני 0-64	62.7	58.0	70.4
כלל האוכלוסייה	67.1	66.7	67.5
2015			
בני 65+	66.3	68.4	64.4
בני 65-74	70.8	70.0	72.0
בני 75+	65.3	67.9	63.1
בני 0-64	65.0	61.6	70.9
כלל האוכלוסייה	66.1	66.8	65.3
2017			
בני 65+	65.6	67.6	63.6
בני 65-74	69.7	69.6	69.9
בני 75+	64.5	66.9	62.5
בני 0-64	64.6	60.8	71.0
כלל האוכלוסייה	65.4	66.1	64.7
2018			
בני 65+	64.4	66.0	63.1
בני 65-74	68.9	69.3	68.2
בני 75+	63.3	64.8	62.1
בני 0-64	64.1	61.1	69.3
כלל האוכלוסייה	64.4	64.9	63.9

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות * חלק מבתי החולים למחלות ממושכות לא נכללו בלוח. לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

לוח 2.8: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2017

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני 65+			סיבות פטירה
גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	
500	524	514	3,398	3,968	3,651	סה"כ*
29	29	29	210	240	223	מחלות זיהומיות
126	132	129	746	983	851	שאתות ממאירות
28	26	27	205	210	207	סוכרת
14	9	12	108	74	93	יתר לחץ-דם
11	15	13	84	115	98	אוטם חריף של שריר הלב
24	37	30	181	321	243	מחלת לב איסכמית אחרת
35	30	32	257	255	256	מחלות לב אחרות
24	24	24	180	202	190	מחלות של כלי דם במוח
						טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
4	5	5	26	45	34	
13	13	13	98	118	107	דלקת ריאות
13	17	15	98	140	116	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
14	14	14	101	122	110	יתר מחלות מערכת הנשימה
4	5	4	23	32	27	מחלות כבד
17	18	18	129	161	143	מחלות כליה
3	4	3				מומים מולדים
25	36	31	157	199	175	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
100	79	90	728	638	688	כל המחלות האחרות
2	7	5	7	19	12	תאונות דרכים
2	7	5	5	17	10	פגיעה עצמית מכוונת
9	15	12	58	75	65	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2017

שיעורים ל-100,000 נפש

נשים			גברים			סיבות פטירה
85+	84-75	74-65	85+	84-75	74-65	
13,126	3,363	969	15,294	4,773	1,616	סה"כ*
828	215	51	937	319	81	מחלות זיהומיות
1,744	901	409	2,528	1,303	562	שאתות ממאירות
706	237	61	725	268	93	סוכרת
578	65	13	377	78	20	יתר לחץ-דם
374	73	17	489	122	47	אוטם חריף של שריר הלב
848	150	30	1,576	331	99	מחלת לב איסכמית אחרת
1,203	211	45	1,184	283	81	מחלות לב אחרות
751	186	33	738	263	80	מחלות של כלי דם במוח
						טרשת עורקים ויתר מחלות
101	26	7	137	58	22	מחזור הדם
495	75	11	609	125	29	דלקת ריאות
						מחלות כרוניות של מערכת
365	98	30	487	188	57	הנשימה התחתונה
444	95	17	603	136	32	יתר מחלות מערכת הנשימה
21	34	17	56	38	24	מחלות כבד
505	144	26	748	192	44	מחלות כליה
0	0	0	0	0	0	מומים מולדים
						סימנים, סימפטומים וסיבות
629	143	46	733	217	97	לא מוגדרות
3,259	639	139	2,955	727	193	כל המחלות האחרות
12	10	3	45	29	9	תאונות דרכים
8	7	3	32	18	14	פגיעה עצמית מכוונת
256	51	11	332	77	29	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.10א: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2017

סיבות פטירה	קבוצת גיל			כלל האוכלוסייה 65+	כלל האוכלוסייה
	85+	84-75	74-65		
סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*	17,299	11,826	7,316	36,441	44,596
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
מחלות זיהומיות	6.2	6.5	5.1	6.1	5.6
שאתות ממאירות	14.6	27.1	37.8	23.3	25.2
סוכרת	5.1	6.3	6.0	5.7	5.2
יתר לחץ-דם	3.6	1.8	1.3	2.5	2.2
אוטם חריף של שריר הלב	3.0	2.4	2.4	2.7	2.5
מחלת לב איסכמית אחרת	8.0	5.7	4.9	6.7	5.9
מחלות לב אחרות	8.6	6.1	4.8	7.0	6.3
מחלות של כלי דם במוח	5.4	5.5	4.3	5.2	4.7
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	0.8	1.0	1.1	0.9	0.9
דלקת ריאות	3.9	2.4	1.5	2.9	2.6
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	2.9	3.4	3.3	3.2	3.0
יתר מחלות מערכת הנשימה	3.6	2.8	1.9	3.0	2.7
מחלות כבד	0.2	0.9	1.6	0.7	0.9
מחלות כליה	4.3	4.1	2.7	3.9	3.5
מומים מולדים					0.6
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	4.8	4.4	5.5	4.8	6.0
כל המחלות האחרות	22.6	17.1	13.0	18.8	17.5
תאונות דרכים	0.2	0.5	0.5	0.3	0.9
פגיעה עצמית מכוונת	0.1	0.3	0.7	0.3	0.9
כל הסיבות החיצוניות האחרות	2.0	1.6	1.6	1.8	2.4

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ ושל כלל הגברים, לפי גיל, 2017

קבוצת גיל				כלל הגברים	סיבות פטירה
85+	84-75	74-65	65+		
					סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
7,132	6,102	4,335	17,569	22,648	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
6.1	6.7	5.0	6.1	5.5	מחלות זיהומיות
16.5	27.3	34.8	24.8	25.1	שאתות ממאירות
4.7	5.6	5.7	5.3	4.9	סוכרת
2.5	1.6	1.2	1.9	1.7	יתר לחץ-דם
3.2	2.6	2.9	2.9	2.8	אוטם חריף של שריר הלב
10.3	6.9	6.1	8.1	7.0	מחלת לב איסכמית אחרת
7.7	5.9	5.0	6.4	5.7	מחלות לב אחרות
4.8	5.5	4.9	5.1	4.5	מחלות של כלי דם במוח
0.9	1.2	1.4	1.1	1.0	טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
4.0	2.6	1.8	3.0	2.5	דלקת ריאות
3.2	3.9	3.5	3.5	3.2	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.9	2.9	2.0	3.1	2.7	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.4	0.8	1.5	0.8	1.0	מחלות כבד
4.9	4.0	2.7	4.1	3.5	מחלות כליה
				0.7	מומים מולדים
4.8	4.6	6.0	5.0	6.9	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
19.3	15.2	12.0	16.1	15.1	כל המחלות האחרות
(0.3)	0.6	0.6	0.5	1.3	תאונות דרכים
(0.2)	0.4	0.9	0.4	1.4	פגיעה עצמית מכוונת
2.2	1.6	1.8	1.9	2.8	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות 65+ ושל כלל הנשים, לפי גיל, 2017

	קבוצת גיל			כלל הנשים	סיבות פטירה
	85+	84-75	74-65		
	10,167	5,724	2,981	18,872	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
	6.3	6.4	5.3	6.2	מחלות זיהומיות
	13.3	26.8	42.2	22.0	שאתות ממאירות
	5.4	7.1	6.3	6.0	סוכרת
	4.4	1.9	1.3	3.2	יתר לחץ-דם
	2.9	2.2	1.7	2.5	אוטם חריף של שריר הלב
	6.5	4.5	3.1	5.3	מחלת לב איסכמית אחרת
	9.2	6.3	4.6	7.6	מחלות לב אחרות
	5.7	5.5	3.4	5.3	מחלות של כלי דם במוח
	0.8	0.8	0.7	0.8	טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
	3.8	2.2	1.1	2.9	דלקת ריאות
	2.8	2.9	3.1	2.9	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
	3.4	2.8	1.8	3.0	יתר מחלות מערכת הנשימה
	0.2	1.0	1.7	0.7	מחלות כבד
	3.8	4.3	2.7	3.8	מחלות כליה
				0.6	מומים מולדים
	4.8	4.3	4.7	4.6	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
	24.8	19.0	14.4	21.4	כל המחלות האחרות
	(0.1)	(0.3)	0.3	0.2	תאונות דרכים
	(0.1)	(0.2)	(0.3)	0.1	פגיעה עצמית מכוונת
	1.9	1.5	1.2	1.7	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.11: התאבדויות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות

כלל האוכלוסייה		75+		74-65		65+		שנה
גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	
מספרים מוחלטים								
79	132	9	10	22	24	31	34	1981
84	220	12	29	14	30	26	59	1990
87	307	13	39	15	19	28	58	2000
121	304	23	35	10	20	33	55	2005
86	394	9	40	14	33	23	73	2010
87	322	7	44	8	28	15	72	2011
81	354	9	35	11	31	20	66	2012
81	291	12	34	8	19	20	53	2013
88	294	11	32	10	18	21	50	2014
73	269	14	30	11	22	25	52	2015
69	321	3	33	8	39	11	72	2016

אחוזים מכלל ההתאבדויות

65+	סה"כ	75+	74-65	64-0	שנה
30.8	100.0	9.0	21.8	69.2	1981
28.0	100.0	13.5	14.5	72.0	1990
21.8	100.0	13.2	8.6	78.2	2000
20.7	100.0	13.6	7.1	79.3	2005
20.0	100.0	10.2	9.8	80.0	2010
21.3	100.0	12.5	8.8	78.7	2011
19.8	100.0	10.1	9.7	80.2	2012
19.6	100.0	12.4	7.3	80.4	2013
18.6	100.0	11.3	7.3	81.4	2014
22.5	100.0	12.9	9.6	77.5	2015
21.3	100.0	9.2	12.1	78.7	2016

מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל

לוח 2.12: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, 2016-2018

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
סה"כ בני 65+	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	14.0	15.8	12.6
טוב	42.5	45.6	40.0
לא כל כך טוב	31.0	28.1	33.3
בכלל לא טוב	12.5	10.5	14.1
כלל האוכלוסייה*	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	53.2	54.8	51.6
טוב	30.9	30.8	31.1
לא כל כך טוב	11.7	10.5	12.8
בכלל לא טוב	4.2	3.9	4.5
דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאוד בדרך כלל			
סה"כ בני 65+	56.5	61.4	52.6
גיל			
74-65	64.8	68.2	61.4
75+	43.5	49.6	38.8
כלל האוכלוסייה*	84.1	85.6	82.7

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.13: בני 65+ וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג פעילות, גיל ומין, 2017

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
עוסקים בפעילות גופנית⁽¹⁾			
סה"כ בני 65+	49.3	50.1	48.7
74-65	52.8	53.8	52.0
75+	43.7	43.6	43.7
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	51.4	54.6	48.3
עוסקים בפעילות גופנית מאומצת (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)⁽³⁾			
סה"כ בני 65+	20.4	25.9	15.8
74-65	26.1	33.0	(19.9)
75+	(9.2)	(10.6)	(8.2)
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	49.7	57.7	41.3
עוסקים בפעילות גופנית מתונה (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)⁽⁴⁾			
סה"כ בני 65+	79.1	81.0	77.5
74-65	79.8	79.3	80.2
75+	77.9	84.8	72.7
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	69.2	66.1	72.6
עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק שרירים (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)⁽⁵⁾			
סה"כ בני 65+	29.4	25.5	32.7
74-65	27.5	25.3	29.5
75+	33.0	(25.9)	38.4
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	35.6	35.7	35.4

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בשלושה החודשים שקדמו לראיון
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+
3. פעילות מאומצת היא פעילות הגורמת להזעה רבה ולעלייה רבה בקצב פעימות הלב, לדוגמה, ריצה, הליכה מהירה, פעילות אירובית. הכוונה לפעילות שנמשכה לפחות 10 דקות ברצף
4. פעילות מתונה היא פעילות הגורמת להזעה קלה ולעלייה מועטה בקצב פעימות הלב, לדוגמה, הליכה, רכיבה על אופניים, שחייה, באופן מתון. הכוונה לפעילות שנמשכה לפחות 10 דקות ברצף
5. פעילות לחיזוק שרירים היא פעילות המיועדת לחיזוק ובניית שרירי הגוף, לדוגמה התעמלות, עיצוב גוף, הרמת משקולות

לוח 2.14: בני 65+ וכלל האוכלוסייה לפי מדד BMI⁽¹⁾, גיל ומין, 2017

אחוזים

מאפיינים	בני 65+			כלל האוכלוסייה ⁽²⁾
	נשים	גברים	סה"כ	
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
תת משקל (עד 18.4)	1.3	3.5
משקל תקין (18.5 עד 24.9)	33.3	34.4	33.9	45.3
משקל עודף (25 עד 29.9)	40.8	42.7	41.7	34.6
השמנה (30 עד 34.9)	16.8	16.6	16.7	12.5
השמנת יתר (35 ומעלה)	7.6	5.0	6.4	4.2
סובלים מהשמנה (BMI 30 ומעלה)				
סה"כ בני 65+	24.4	21.6	23.1	
גיל				
74-65	23.9	22.3	23.1	
75+	25.3	20.4	23.1	
קבוצת אוכלוסייה				
יהודים ואחרים	23.1	20.6	21.9	
ערבים	40.8	(32.5)	36.4	
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	16.4	17.0	16.7	

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. מדד BMI לבדיקת יחס גובה ומשקל, נקבע באמצעות חלוקת משקל הגוף (בק"ג) בגובה (במטר) בריבוע. נתוני גובה ומשקל בסקר החברתי הם לפי דיווח עצמי של המרואיינים
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.15: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המעשנים, לפי גיל ומין, 2017

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מעשנים כיום (כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת, נרגילה, בכל תדירות שהיא)	11.1	14.9	8.0
מעשנים סיגריות לפחות פעם אחת ביום	11.0	14.8	7.9
מעשנים לפי מספר הסיגריות ביום ⁽¹⁾			
סה"כ	100.0	100.0	100.0
עד 5	(19.7)	(15.7)	(25.8)
10-6	(27.7)	(22.3)	(36.1)
20-11	36.2	(39.6)	(31.1)
יותר מ-20	(16.4)	(22.4)	..
עישנו בעבר והפסיקו (מאלה שלא מעשנים היום)	36.0	56.3	20.5
גיל הפסקת עישון (מתוך אלו שעישנו בעבר והפסיקו)			
סה"כ	100.0	100.0	100.0
עד 19
29-20	(8.5)	(7.4)	(10.7)
39-30	17.6	19.3	(14.2)
49-40	21.2	22.3	(19.0)
59-50	21.0	21.4	(20.2)
60 ומעלה	31.0	28.6	36.0
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ המעשנים כיום (כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת, נרגילה)	23.2	31.6	15.2
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ המעשנים סיגריות לפחות פעם אחת ביום	22.1	30.1	14.7

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בקרב מעשנים כיום

2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.16: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2017

אחוזים

מאפיינים	בני 65+			כלל האוכלוסייה ⁽²⁾
	נשים	גברים	סה"כ	
דיווחו על קושי להירדם או לישון במשך לילה שלם				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
בכל לילה או כמעט בכל לילה	31.5	23.2	27.8	15.1
פעמיים - שלוש בשבוע	16.5	10.1	13.6	11.1
פעם בשבוע או פחות	14.3	11.4	12.9	13.7
לא היה קושי	37.7	55.3	45.7	60.1
דיווחו על קושי כלשהו להירדם או לישון במשך לילה שלם				
סה"כ	62.3	44.7	54.3	39.9
74-65	56.9	42.8	50.3	
75+	70.6	47.9	60.8	
דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום⁽³⁾				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
עיפות רבה	21.6	11.0	16.8	14.4
עיפות מסויימת	41.7	37.5	39.8	39.4
לא כל כך	13.4	18.0	15.5	16.5
בכלל לא	23.3	33.5	27.9	29.7
דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום כלשהם במשך היום⁽³⁾				
סה"כ	76.7	66.5	72.1	70.3
74-65	71.9	63.4	67.9	
75+	84.2	71.8	78.8	

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בחודש האחרון
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה
3. מתוך אלו שיש להם בעיות שינה

לוח 2.17: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2017

סוף שנה

מאפיינים	65+	69-65	74-70	79-75	84-80	85+	כלל האוכלוסייה
מספרים מוחלטים							
סה"כ	16,211	4,412	3,842	3,067	2,465	2,425	28,927
גברים	8,440	2,252	2,127	1,668	1,276	1,117	13,569
נשים	7,771	2,160	1,715	1,399	1,189	1,308	15,358
שיעורים ל-100,000 נפש							
סה"כ	1,625	1,292	1,638	1,805	1,879	2,007	332
גברים סה"כ	1,906	1,408	1,962	2,245	2,354	2,439	314
מזה: קיבה	66	35	60	101	96	96	10
מעיי גס וחלחולת	222	151	197	272	334	319	36
ריאה	238	173	264	277	310	258	37
ערמונית	357	325	470	440	269	172	50
שלפוחית השתן	199	140	191	236	286	266	29
לימפומה ממארת	98	66	102	127	131	109	21
ליקמיה	46	27	40	57	66	85	8
נשים סה"כ	1,400	1,191	1,359	1,463	1,544	1,744	350
מזה: קיבה	36	27	25	51	42	55	10
מעיי גס וחלחולת	168	115	138	188	229	259	33
ריאה	121	105	129	129	122	133	22
שד	370	402	418	316	347	304	110
שחלה	33	25	28	45	35	40	9
שלפוחית השתן	34	26	26	41	49	44	6
לימפומה ממארת	79	79	82	101	90	73	19
ליקמיה	32	18	25	28	48	64	7

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

לוח 2.18: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	2017	2016	2015	2010	2006	
גברים						
סה"כ יהודים ואחרים*	1,926	1,953	2,006	2,287	2,309	
מזה: קיבה	67	79	74	91	91	
מעיי גס וחלחולת	222	233	248	307	379	
ריאה	225	247	242	252	231	
ערמונית	367	345	377	559	556	
שלפוחית השתן	202	211	222	239	236	
לימפומה ממארת	101	99	103	97	111	
ליקמיה	47	50	46	62	58	
סה"כ ערבים	1,700	1,698	1,628	2,286	2,062	
מזה: קיבה	52	61	37	57	101	
מעיי גס וחלחולת	232	203	210	305	229	
ריאה	381	409	401	449	392	
ערמונית	253	214	248	354	353	
שלפוחית השתן	178	243	193	255	309	
לימפומה ממארת	65	64	66	82	95	
ליקמיה	29	48	43	73	66	
נשים						
סה"כ יהודיות ואחרות*	1,443	1,518	1,562	1,578	1,468	
מזה: קיבה	37	39	39	47	47	
מעיי גס וחלחולת	167	183	198	222	243	
ריאה	127	127	126	111	85	
שד	385	423	442	394	343	
שחלה	34	31	41	36	40	
שלפוחית השתן	36	36	44	38	37	
לימפומה ממארת	80	84	86	67	76	
ליקמיה	31	35	34	31	31	
סה"כ ערביות	916	1,072	1,078	1,181	995	
מזה: קיבה	37	43	25	34	52	
מעיי גס וחלחולת	183	124	169	202	151	
ריאה	55	61	78	58	48	
שד	194	293	282	205	219	
שחלה	15	27				
שלפוחית השתן	22	45	29	12	18	
לימפומה ממארת	59	54				
ליקמיה	35	36				

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.19: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2017

סוף שנה

מאפיינים	65+	69-65	74-70	75+
מספרים מוחלטים				
סה"כ יהודים בני 65+	14,603	3,934	3,368	7,301
גברים	7,481	1,971	1,827	3,683
נשים	7,122	1,963	1,541	3,618
שיעורים ל-100,000 נפש				
גברים				
ילידי ישראל	1,654	1,220	1,937	2,307
ילידי אירופה-אמריקה	2,145	1,655	1,821	2,616
ילידי אסיה	1,725	1,287	1,626	1,990
ילידי אפריקה	1,838	1,544	1,821	2,077
נשים				
ילידות ישראל	1,391	1,190	1,497	1,664
ילידות אירופה-אמריקה	1,619	1,470	1,373	1,794
ילידות אסיה	1,303	1,216	1,249	1,362
ילידות אפריקה	1,238	1,044	1,116	1,438

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות

לוח 2.20: הימצאות דמנציה⁽¹⁾ בקרב בני 45+ לפי גיל ומין, 2016

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
54-45	321	153	168
64-55	1,963	1,037	926
74-65	7,560	3,927	3,933
84-75	25,124	9,162	15,962
85+	30,983	9,709	21,274
סה"כ 65+	63,667	22,798	41,169
שיעורים ל-100 נפש			
54-45	0.0	0.0	0.0
64-55	0.3	0.3	0.2
74-65	1.4	1.4	1.3
84-75	8.4	7.1	9.3
85+	22.1	18.2	24.5
סה"כ 65+	6.4	5.3	7.4
שיעורים מתוקננים לגיל⁽²⁾			
בני 45 ומעלה	2.3	2.8	
בני 65 ומעלה	5.4	6.7	

מקור: נתונים שהתקבלו מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות

1. הנתונים מבוססים על סקר שנערך בקרב מבוטחי ארבע קופות החולים. שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-25%-50%. בהתאם לכך, ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. לפרטים נוספים ראו במבוא

2. שיעורים מתוקננים לגיל מאפשרים להשוות בין קבוצות שהתפלגות הגיל שלהן שונה. השיעורים המתוקננים מציגים את הנתונים כאילו התפלגות הגיל בקבוצות אלו הייתה זהה. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל 2016

לוח 2.21: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2016-2018

אחוזים, ממוצע שנתי

להתלבש או להתרחץ			ללכת או לעלות במדרגות			סה"כ	סה"כ באלפים ⁽¹⁾	מאפיינים
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
11.9	11.4	76.6	28.3	17.2	54.5	100.0	998.4	סה"כ בני 65+
גיל								
6.8	8.1	85.1	19.6	16.7	63.6	100.0	623.9	בני 65-74
20.4	16.9	62.8	42.3	18.1	39.6	100.0	374.5	בני 75+
מין								
9.6	10.5	80.0	24.1	16.2	59.6	100.0	451.8	גברים
13.8	12.2	73.9	31.6	18.1	50.3	100.0	546.7	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
10.3	10.6	79.1	25.9	17.3	56.7	100.0	906.6	יהודים ואחרים מזה: עולי
12.7	16.3	71.0	33.7	25.5	40.8	100.0	177.7	בריה"מ לשעבר
29.2	20.0	50.8	52.4	16.5	31.0	100.0	91.8	ערבים
לזכור או להתרכז			פעולות הקשורות למשק הבית ⁽³⁾			סה"כ	סה"כ באלפים	מאפיינים
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
8.3	31.3	60.4	25.5	14.8	59.6	100.0	998.4	סה"כ בני 65+
גיל								
5.1	26.3	68.6	16.4	14.4	69.2	100.0	623.9	בני 65-74
13.6	39.5	46.8	40.4	15.6	43.8	100.0	374.5	בני 75+
מין								
7.8	29.1	63.1	20.4	12.9	66.6	100.0	451.8	גברים
8.7	33.2	58.1	29.7	16.4	53.8	100.0	546.7	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
7.3	30.9	61.8	22.9	14.7	62.4	100.0	906.6	יהודים ואחרים מזה: עולי
9.7	33.2	57.0	27.2	22.2	50.6	100.0	177.7	בריה"מ לשעבר
18.4	35.8	45.8	53.7	15.9	30.4	100.0	91.8	ערבים



לוח 2.21: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2018-2016 (המשך)

אחוזים, סוף שנה

לשמוע ⁽⁵⁾			לראות ⁽⁴⁾			סה"כ	סה"כ באלפים ⁽¹⁾	מאפיינים
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
8.7	26.8	64.6	7.6	21.8	70.6	100.0	998.4	סה"כ בני 65+
גיל								
5.4	22.3	72.3	3.8	17.7	78.5	100.0	623.9	בני 65-74
14.0	34.0	51.9	13.7	28.6	57.8	100.0	374.5	בני 75+
מין								
10.4	29.1	60.5	6.8	20.0	73.1	100.0	451.8	גברים
7.3	24.8	67.9	8.2	23.3	68.6	100.0	546.7	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
8.3	26.9	64.8	7.2	20.8	72.0	100.0	906.6	יהודים ואחרים
8.3	25.4	66.3	7.5	26.6	65.9	100.0	177.7	מזה: עולי בריה"מ לשעבר
12.6	25.1	62.4	11.3	32.0	56.7	100.0	91.8	ערבים

מקור: למ"ס, עיבוד על נתוני הסקר החברתי לשנים 2016-2018

1. אוכלוסיית הסקר החברתי לשנת 2018
2. כולל אלה שאינם יכולים כלל לבצע את הפעולה/תפקוד
3. כגון: נקיון, קניות וסידורים מחוץ לבית
4. גם כאשר מרכיב/ה משקפיים
5. גם כאשר מרכיב/ה מכשיר שמיעה

לוח 2.22: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2018

מספרים מוחלטים

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	2,414	78	433	1,903
גברים	1,346	55	232	1,059
נשים	1,068	23	201	844
בני 65-74				
סה"כ	1,464	36	220	1,208
גברים	826	25	124	677
נשים	638	11	96	531
בני 75+				
סה"כ	950	42	213	695
גברים	520	30	108	382
נשים	430	12	105	313
בני 65+ לפי מעמד הנפגע				
הולך רגל	799	46	213	540
נהג רכב	1,044	21	107	916
נוסע ברכב	482	3	75	404
אחר	89	8	38	43
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	2,111	66	383	1,662
ערבים	234	8	37	189
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	23,019	316	2,166	20,537
גברים	13,714	247	1,577	11,890
נשים	9,305	69	589	8,647

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.23: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2018

שיעורים ל-100,000 נפש

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	233	8	42	183
גברים	292	12	50	230
נשים	185	4	35	146
בני 65-74				
סה"כ	240	6	36	198
גברים	291	9	44	238
נשים	196	3	29	163
בני 75+				
סה"כ	222	10	50	163
גברים	294	17	61	216
נשים	172	5	42	125
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	234	7	42	184
ערבים	265	9	42	214
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	259	4	24	231
גברים	311	6	36	270
נשים	208	2	13	193

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.24: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש

שנה	סה"כ נפגעים		מזה: הרוגים	
	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה
1985	378	442	24	9
1990	459	594	23	9
2001	219	584	12	8
2002	290	581	16	8
2003	273	554	12	7
2004	283	542	13	7
2005	277	512	12	6
2006	295	509	12	6
2007	278	457	11	6
2008	275	435	11	6
2009	249	425	8	4
2010	250	368	10	5
2011	253	349	8	4
2012	226	302	7	3
2013	249	301	6	3
2014	225	267	7	3
2015	234	264	11	4
2016	232	260	8	4
2017	237	265	9	4
2018	233	259	8	4

מקורות: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.25: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2018

חומרת התאונות				מאפיינים
קלות	קשות	קטלניות	סה"כ	
מספרים מוחלטים				
2,043	350	58	2,451	נהגים מעורבים בני 65+
גיל				
1,406	232	36	1,674	בני 65-74
637	118	22	777	בני 75+
מין				
1,585	290	52	1,927	גברים
458	60	6	524	נשים
כלל הנהגים המעורבים				
18,029	2,871	490	21,390	סה"כ⁽¹⁾
12,880	2,379	430	15,689	גברים
5,149	492	60	5,701	נשים
שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾				
38	7	1	46	סה"כ
48	9	2	58	גברים
23	3	0	26	נשים
כלל הנהגים המעורבים				
42	7	1	50	סה"כ
53	10	2	65	גברים
27	3	0	30	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2018 ובסוף 2017

לוח 2.26: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על ביצוע בדיקות רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 2017

אחוזים

מועד ביצוע הבדיקה האחרונה ⁽¹⁾					מאפיינים
סה"כ	מעל שנתיים	מעל שנה ועד שנתיים	בשנה אחרונה	עשו בדיקה	
					בדיקת ממוגרפיה
100.0	28.4	31.0	40.6	91.8	נשים בנות +65
100.0	21.7	31.6	46.7	74.7	כלל האוכלוסייה ⁽²⁾
					בדיקת צוואר הרחם (PAP)
100.0	64.1	17.0	18.9	52.4	נשים בנות +65
100.0	39.0	26.4	34.6	62.2	כלל האוכלוסייה ⁽³⁾
					בדיקת דם סמוי
100.0	32.0	24.4	43.6	71.8	סה"כ בני 65+
100.0	30.8	25.8	43.4	74.0	גברים
100.0	33.1	23.2	43.8	70.0	נשים
100.0	28.9	25.0	46.1	52.1	כלל האוכלוסייה ⁽⁴⁾
					בדיקת קולונוסקופייה
100.0	59.4	20.9	19.7	57.9	סה"כ בני 65+
100.0	59.4	22.0	18.6	60.4	גברים
100.0	59.5	19.8	20.7	55.8	נשים
100.0	55.2	22.1	22.7	39.0	כלל האוכלוסייה ⁽⁴⁾

- מקור: למ"ס, הסקר החברתי
1. מתוך אלה שעשו את הבדיקה
 2. לנשים בנות 40 ומעלה
 3. לנשים בנות 25 ומעלה
 4. לבני 40 ומעלה

לוח 2.27: בני 65+ וכלל האוכלוסייה* אשר קיבלו חיסון נגד שפעת לפי גיל ומין, 2017

			אחוזים
נשים	גברים	סה"כ	מאפיינים
59.3	62.7	60.8	סה"כ בני 65+ גיל
57.1	59.5	58.2	בני 65-74
62.6	68.3	65.1	בני 75+
26.8	24.3	25.6	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* בני 20 ומעלה

לוח 2.28: ביקורים וביקורים חוזרים של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2018

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספר ביקורים⁽²⁾ (באלפים)			
סה"כ בני 65+ גיל	599.1	281.8	317.3
בני 65-74 גיל	256.4	130.8	125.6
בני 75-84 גיל	210.4	96.8	113.6
בני 85+ גיל	132.3	54.2	78.1
כלל האוכלוסייה	2,643.5	1,348.2	1,295.3
אחוז הביקורים של בני 65+ מתוך כלל הביקורים	22.7	20.9	24.5
שיעורים לאלף נפש			
סה"כ בני 65+ גיל	567.1	599.6	541.1
בני 65-74 גיל	420.4	459.9	386.0
בני 75-84 גיל	701.1	743.2	668.4
בני 85+ גיל	1,043.7	1,125.2	993.2
כלל האוכלוסייה	295.1	310.1	280.8
ביקורים חוזרים⁽³⁾ בתוך 30 ימים (אחוזים)			
סה"כ בני 65+ גיל	22.5	24.0	21.1
בני 65-74 גיל	21.2	22.7	19.7
בני 75-84 גיל	23.3	25.0	21.8
בני 85+ גיל	23.7	25.5	22.5
כלל האוכלוסייה	17.4	17.4	17.5

מקור: "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה - מאפייני הפעילות 2018" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)

1. חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של 29 בתי חולים לאשפוז כללי ללא בתי החולים במזרח ירושלים. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום
2. מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל ביקורים עקב לידה
3. ביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה

לוח 2.29: אשפוזים* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש

מאפיינים	2000	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018
בני 65+ סה"כ	494	497	445	437	434	422	416	404
גברים	570	560	503	493	492	479	473	458
נשים	437	449	400	393	388	377	371	361
בני 65-74 סה"כ	397	370	327	318	315	308	305	298
גברים	468	435	385	375	373	365	362	354
נשים	342	316	277	269	265	259	256	249
בני 75+ סה"כ	617	636	584	579	581	570	568	556
גברים	710	715	659	651	659	646	646	626
נשים	553	581	532	528	527	517	513	506
בני 75-84 סה"כ	569	581	530	519	519	511	506	494
גברים	661	660	606	593	600	588	584	569
נשים	503	525	473	464	458	453	447	437
בני 85+ סה"כ	770	775	720	727	733	715	717	703
גברים	877	872	810	816	822	808	814	781
נשים	703	718	667	674	681	660	658	655
כלל האוכלוסייה סה"כ	144	148	140	138	138	136	135	133
גברים	142	143	135	133	133	131	130	129
נשים	146	153	145	143	143	140	139	138

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.30: אשפוזים* של בני 65+ במחלקות כלליות, מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

								אחוזים
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2010	2000	מאפיינים
								בני 65+
35.4	35.4	34.8	34.5	34.0	33.5	33.3	34.1	סה"כ
37.2	37.2	36.5	36.0	35.2	34.7	33.8	34.0	גברים
33.7	33.8	33.3	33.1	32.8	32.4	32.9	34.1	נשים
								בני 75+
20.0	20.4	20.5	20.6	20.5	20.2	20.3	18.8	סה"כ
19.5	20.0	19.9	20.1	19.8	19.5	19.3	18.0	גברים
20.5	20.9	20.9	21.1	21.1	20.9	21.3	19.6	נשים
								בני 85+
7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.1	6.9	5.7	סה"כ
6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.3	6.1	5.1	גברים
8.4	8.4	8.3	8.4	8.2	7.9	7.7	6.3	נשים

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.31: בני 65+ מכלל המאושפזים, לפי מחלקות*, שנים נבחרות

אחוזים

מחלקה	2000	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018
כלל המחלקות הכלליות	34.1	33.3	33.5	34.0	34.5	34.8	35.4	35.4
פנימית	58.0	58.9	60.1	60.7	61.5	61.9	62.9	62.4
ריאות	46.1	47.6	50.9	52.8	51.8	51.8	52.6	55.5
גריאטרייה חריפה	96.1	95.8	98.8	98.5	98.5	99.1	99.0	99.0
נירולוגיה	33.9	32.1	34.8	35.4	36.1	37.1	37.7	40.3
אונקולוגיה	37.9	38.3	40.5	41.6	43.6	46.5	47.6	48.7
עור ומין	32.1	32.1	32.9	35.7	37.8	38.6	41.7	38.5
השתלת מוח עצם	3.6	8.5	16.0	15.7	15.7	15.1	19.0	19.0
טיפול נמרץ כללי	47.6	48.3	47.7	47.7	49.4	48.0	49.9	49.4
טיפול נמרץ לב	50.4	49.4	50.9	51.3	52.5	53.6	54.3	55.2
טיפול נמרץ נשימתי	73.9	64.4	57.8	57.4	61.1	59.3	59.1	62.0
כירורגייה כללית	27.2	27.2	27.0	27.6	28.8	29.8	30.6	30.2
אורתופדיה	32.4	34.7	35.6	36.0	36.4	36.5	37.4	37.9
אורולוגיה	40.3	37.9	40.6	40.5	41.3	42.4	43.5	43.4
נירוכיורגייה	28.8	33.6	34.5	36.3	37.0	37.1	38.3	38.3
כירורגייה חזה ולב	47.4	47.5	48.2	47.6	48.0	49.0	50.9	51.3
כירורגייה כלי דם	55.8	53.4	54.0	53.5	55.7	56.1	58.0	60.0
כירורגייה פלסטית	28.1	28.1	26.7	26.3	26.9	27.0	29.6	30.5
עיניים	58.4	60.8	59.2	58.1	57.4	57.7	59.0	59.7
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	11.9	13.0	14.5	14.0	14.4	14.5	15.9	16.5
פה ולסת	11.6	10.9	13.5	12.9	11.3	13.2	13.5	14.5
נשים	3.9	3.2	3.5	3.5	3.6	3.9	3.9	3.5
השהיה	36.2	34.4	28.9	29.6	28.5	26.7	28.0	27.3

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.32: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2018

אחוזים			
מחלקה	סה"כ	גברים	נשים
כלל המחלקות הכלליות*	100.0	100.0	100.0
פנימית	45.1	44.2	46.1
ריאות	0.4	0.4	0.4
גריאטרייה חריפה	3.9	3.1	4.7
נירולוגיה	2.2	2.3	2.0
אונקולוגיה	1.5	1.7	1.4
עור ומין	0.5	0.5	0.4
השתלת מוח עצם	0.1	0.1	0.0
טיפול נמרץ כללי	2.1	2.3	1.8
טיפול נמרץ לב	4.1	5.1	3.1
טיפול נמרץ נשימתי	0.2	0.2	0.2
כירורגייה כללית	14.6	14.9	14.3
אורתופדיה	6.0	4.4	7.7
אורולוגיה	3.8	6.0	1.5
נירוכירורגייה	1.1	1.2	1.0
כירורגייה חזה ולב	1.6	1.9	1.2
כירורגייה כלי דם	1.2	1.7	0.7
כירורגייה פלסטית	0.7	0.7	0.6
עיניים	3.8	3.6	4.1
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	1.2	1.2	1.1
פה ולסת	0.1	0.1	0.1
נשים	1.0	0.0	2.0
השהיה	5.0	4.4	5.6

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות
 * שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.33: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2018

ימים

מחלקה	כלל האוכלוסייה			בני 65+		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
כלל המחלקות הכלליות*	3.7	4.2	3.9	5.3	5.1	5.2
פנימית	4.7	4.5	4.6	5.1	4.9	5.0
ריאות	4.5	4.6	4.5	4.7	4.7	4.7
גריאטרייה חריפה	10.7	11.4	11.0	10.6	10.9	10.7
נירולוגיה	5.1	5.2	5.1	6.4	6.1	6.2
אונקולוגיה	6.5	6.0	6.2	7.0	6.1	6.5
עור ומין	6.7	6.5	6.6	8.7	7.1	7.8
השתלת מוח עצם	17.3	17.2	17.2	17.6	16.3	16.7
טיפול נמרץ כללי	5.4	6.2	5.9	6.0	6.7	6.4
טיפול נמרץ לב	2.7	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8
טיפול נמרץ נשימתי	3.2	3.4	3.3	3.5	3.0	3.3
כירורגייה כללית	2.7	2.6	2.7	3.8	3.6	3.7
אורתופדיה	4.9	4.5	4.6	6.1	6.2	6.1
אורולוגיה	3.3	3.1	3.1	3.6	3.7	3.7
נירוכיורוגייה	5.8	6.1	6.0	6.4	6.6	6.5
כירורגייה חזה ולב	5.8	6.2	6.1	5.7	6.4	6.1
כירורגייה כלי דם	4.3	5.0	4.7	4.6	5.0	4.9
כירורגייה פלסטית	4.3	5.4	4.8	4.7	4.3	4.5
עיניים	1.8	2.0	1.9	1.6	1.7	1.7
אף-אוזן-גרון						
וכירורגייה ראש וצוואר	2.8	2.7	2.7	3.9	4.2	4.0
פה ולסת	3.4	4.4	4.0	4.3	5.1	4.7
נשים	2.1	1.2	2.1	3.4	1.0	3.4
השהיה	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות
 * שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.34: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המטופלים* בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי במרפאות ממשלתיות, 2018

סוף שנה

סה"כ	
מספרים מוחלטים	
מטופלים בני 65+	5,306
מטופלים בכלל האוכלוסייה	43,417
אחוזים	
בני 65+ מכלל המטופלים	12.2
מטופלים בני 65+ מכלל בני 65+	0.5
כלל המטופלים מתוך האוכלוסייה	0.5

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה * אנשים שהיה להם לפחות מגע אחד בתקופה הנתונה

לוח 2.35: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2018

מספרים מוחלטים, סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
בני 65+	10	4	6
בני 65-74	8	2	6
בני 75-84	2	2	0
בני 85+	0	0	0
כלל האוכלוסייה	202	108	94

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.36: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מלא, לפי גיל ומין, 2018

סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
כלל בני 65+	329	186	143
בני 65-74	268	154	114
בני 75-84	54	27	27
בני 85+	7	5	2
כלל האוכלוסייה	3,308	2,223	1,085
שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה			
כלל בני 65+	0.3	0.4	0.2
בני 65-74	0.4	0.5	0.3
בני 75-84	0.2	0.2	0.2
בני 85+	0.1	0.1	0.0
כלל האוכלוסייה	0.4	0.5	0.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

**לוח 2.37: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+,
והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין,
שנים נבחרות**

שיעורים ל-1,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	1990	2000	2009	2015	2017	2018
כלל בני 65+						
סה"כ	3.5	1.5	0.4	0.4	0.3	0.3
גברים	3.1	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4
נשים	3.9	1.5	0.3	0.3	0.3	0.2
בני 65-74						
סה"כ	3.6	1.7	0.5	0.5	0.4	0.4
גברים	3.7	1.7	0.5	0.6	0.5	0.5
נשים	3.5	1.6	0.5	0.4	0.4	0.3
בני 75-84						
סה"כ	3.6	1.3	0.3	0.2	0.2	0.2
גברים	2.3	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2
נשים	4.5	1.5	0.3	0.3	0.3	0.2
בני 85+						
סה"כ	3.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
גברים	1.8	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1
נשים	4.0	1.2	0.1	0.1	0.1	0.0
כלל האוכלוסייה						
סה"כ	1.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4
גברים	2.1	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5
נשים	1.5	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.38: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

מאפיינים	1990	2000	2010	2015	2017	2018
כלל בני 65+						
סה"כ	1,412	1,867	1,645	1,949	2,072	2,065
גברים	526	641	758	913	955	905
נשים	886	1,226	887	1,036	1,117	1,160
בני 65-74						
סה"כ	892	1,117	1,005	1,287	1,426	1,421
גברים	321	408	497	636	707	662
נשים	571	709	508	651	719	759
בני 75-84						
סה"כ	467	621	540	539	535	544
גברים	181	186	214	221	199	208
נשים	286	435	326	318	336	336
בני 85+						
סה"כ	53	129	100	123	111	100
גברים	24	47	47	56	49	35
נשים	29	82	53	67	62	65
כלל האוכלוסייה						
סה"כ	12,262	18,172	20,918	22,515	23,882	23,851
גברים	6,788	10,632	13,095	13,999	14,675	14,579
נשים	5,474	7,540	7,823	8,516	9,207	9,272

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.39: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2018

כלל האוכלוסייה	בני 85+	בני 75-84	בני 65-74	בני 65+	אבחנה
23,851	100	544	1,421	2,065	מספרים מוחלטים
					סה"כ קבלות
11,327	10	115	588	713	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
2,062	21	46	61	128	הפרעות פסיכוטיות חריפות
4,109	28	236	561	825	הפרעות אפקטיביות
635	34	95	57	186	הפרעות אורגניות
1,819	5	30	90	125	הפרעות נירוטיות
1,015		3	17	20	הפרעות אישיות
462		1		1	הפרעות בגיל הילדות
827	1	2	6	9	סמים ואלכוהול
69			2	2	פיגור שכלי
1,353	1	16	38	55	הסתכלות
173			1	1	לא ידוע
					אחוזים
					סה"כ קבלות
47.5	10.0	21.1	41.4	34.5	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
8.6	21.0	8.5	4.3	6.2	הפרעות פסיכוטיות חריפות
17.2	28.0	43.4	39.5	40.0	הפרעות אפקטיביות
2.7	34.0	17.5	4.0	9.0	הפרעות אורגניות
7.6	5.0	5.5	6.3	6.1	הפרעות נירוטיות
4.3	0.0	0.6	1.2	1.0	הפרעות אישיות
1.9	0.0	0.2	0.0	0.0	הפרעות בגיל הילדות
3.5	1.0	0.4	0.4	0.4	סמים ואלכוהול
0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	פיגור שכלי
5.7	1.0	2.9	2.7	2.7	הסתכלות
0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	לא ידוע

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.40: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2018

גיל	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
כלל בני 65+	581	254	327
בני 65-74	313	142	171
בני 75-84	211	89	122
בני 85+	57	23	34
כלל האוכלוסייה	5,260	3,014	2,246
שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה			
כלל בני 65+	0.6	0.5	0.6
בני 65-74	0.5	0.5	0.5
בני 75-84	0.7	0.7	0.7
בני 85+	0.4	0.5	0.4
כלל האוכלוסייה	0.6	0.7	0.5

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.41: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

מאפיינים	בני 65+	בני 74-65	בני 84-75	בני 85+ כלל האוכלוסייה
נובמבר 2010				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	66.0	62.1	69.3	52.5
מכבי שירותי בריאות	18.8	21.4	16.7	24.7
קופת חולים לאומית	7.4	7.6	7.3	9.2
קופת חולים מאוחדת	7.8	8.9	6.7	13.6
נובמבר 2015				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	61.1	57.8	63.4	52.3
מכבי שירותי בריאות	22.2	24.4	20.9	25.2
קופת חולים לאומית	7.4	7.5	7.4	8.7
קופת חולים מאוחדת	9.3	10.4	8.3	13.8
נובמבר 2017				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	59.8	56.7	61.8	52.1
מכבי שירותי בריאות	23.4	25.3	22.2	25.7
קופת חולים לאומית	7.2	7.4	7.2	8.3
קופת חולים מאוחדת	9.6	10.6	8.8	13.9
נובמבר 2018				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	59.2	56.2	61.2	51.9
מכבי שירותי בריאות	23.8	25.7	22.7	26.0
קופת חולים לאומית	7.2	7.4	7.0	8.2
קופת חולים מאוחדת	9.8	10.7	9.0	13.9

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.42: בני 65+ מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, 1994-2018

אחוזים

מועד	סה"כ	שירותי בריאות כללית	מכבי שירותי בריאות	קופת חולים לאומית	קופת חולים מאוחדת
דצמבר 1994	10.2	13.1	4.9	7.2	4.1
דצמבר 1995	10.1	12.9	5.1	7.4	4.4
נובמבר 1996	10.0	13.0	5.2	7.3	4.4
נובמבר 1997	10.1	13.2	5.4	7.2	4.4
נובמבר 1998	10.0	13.2	5.5	7.4	4.6
נובמבר 1999	10.0	13.1	5.6	7.4	4.7
נובמבר 2000	10.0	13.1	5.8	7.5	4.8
נובמבר 2001	10.0	13.1	6.0	7.5	5.0
נובמבר 2002	10.1	13.1	6.3	7.7	5.2
נובמבר 2003	10.2	13.2	6.6	7.9	5.3
נובמבר 2004	10.2	13.2	6.8	8.0	5.4
נובמבר 2005	10.2	13.1	7.0	7.9	5.5
נובמבר 2006	10.4	13.2	7.3	8.0	5.8
נובמבר 2007	10.1	12.9	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2008	10.1	12.8	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2009	10.1	12.8	7.5	8.1	5.6
נובמבר 2010	10.2	12.8	7.7	8.2	5.8
נובמבר 2011	10.0	12.6	7.6	8.2	5.8
נובמבר 2012	10.7	13.0	8.7	8.7	6.7
נובמבר 2013	10.9	13.1	9.2	9.1	7.0
נובמבר 2014	11.1	13.1	9.7	9.2	7.3
נובמבר 2015	11.4	13.3	10.1	9.6	7.7
נובמבר 2016	11.7	13.5	10.5	10.1	8.0
נובמבר 2017	11.9	13.7	10.8	10.4	8.3
נובמבר 2018	12.1	13.8	11.1	10.6	8.6

מקור: המוסד לביטוח לאומי

