

מאפיינים בריאותיים של בני 65+ ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

2. מאפיינים בריאותיים של בני +65 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של בני +65 בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של בני +65 אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד להתנהגות בריאותית ובשמירה על בריאותם.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של בני +65 ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשה באיכות חייו של האדם. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של בני +65 ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, סגנון חיים, מחלות, מוגבלות ותמותה, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. עוד מובאים נתונים על דפוסי השימוש של בני +65 בשירותי הבריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

♦ **תוחלת החיים בלידה** הגיעה בשנת 2020 ל-84.8 שנים לנשים ול-80.7 שנים לגברים. תוחלת החיים של יהודים ואחרים גבוהה מזו של הערבים: בשנת

2020 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 4.8 שנים לגברים ו-3.8 שנים לנשים (לוח 2.1).

- **תוחלת החיים בגיל 65 בשנים 2016-2020** היא 21.9 שנים לנשים ו-19.5 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 86.9 בממוצע, וגבר – עד גיל 84.5. תוחלת החיים בגיל 65 של יהודים גבוהה מזו של ערבים (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 13.6 שנים ולגברים 12.1 שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת החיים של גברים בני 75 ב-3.6 שנים ושל נשים בנות 75 ב-4.4 שנים (לוח 2.3).

- **היישוב שבו תוחלת החיים בלידה** היא הגבוהה ביותר (מבין היישובים שבהם 50,000 תושבים ויותר) הוא מודיעין-מכבים-רעות – 86.0 שנים. היישובים שבהם תוחלת החיים הגבוהה ביותר הם מודיעין-מכבים-רעות, הוד השרון, נס ציונה, גבעתיים ורעננה. היישוב בו תוחלת החיים בגיל 65 היא הגבוהה ביותר הוא הוד השרון (23.0 שנים). היישובים שבהם תוחלת החיים הנמוכה ביותר הם לוד, נצרת, אילת, רהט ואום אל-פחם (78.9 שנים). הפער בתוחלת החיים בין היישוב עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר ליישוב בו תוחלת החיים נמוכה ביותר הוא 7.1 שנים ובגיל 65 הפער הוא 5.6 שנים (לוח 2.4).

♦ ב-2019 עמד **שיעור הפטירה** המתוקן לגיל ל-1,000 בני 65+ על 40 בקרב הגברים ועל 31 בקרב הנשים. שיעור הפטירה המתוקן ל-1,000 בני 65+ בקרב הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים: 49 בקרב הגברים ו-41 בקרב הנשים (לוח 2.5).

- בשנת 2019 שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי ישראל היה 33 בקרב ילידי אסיה 42, בקרב ילידי אפריקה 35 ובקרב ילידי אירופה-אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) 43. שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי בריה"מ לשעבר הוא 38 (לוח 2.6).

- 60.8% מבני 65+ **נפטרו בבית חולים** בשנת 2020, שיעור מעט נמוך מזה שבקרב בני 0-64 (62.6%). בקרב בני 65+ 63.7% מהגברים ו-58.1% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 59.5% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 68.2% מהנשים. יש לשים לב כי הנתונים אינם כוללים

את כל בתי החולים למחלות ממושכות ולכן יתכן שהנתונים, במיוחד לגבי בני +65, מוטים כלפי מטה (לוח 2.7).

- **סיבת הפטירה העיקרית**, הן בקרב בני +65 והן בכלל האוכלוסייה, היא שאתות ממאירות. בקרב בני +65 סיבות עיקריות נוספות הן מחלות לב, דמנציה, סוכרת, מחלות זיהומיות ומחלות של כלי דם במוח (לוח 2.8).

- ב-2019 נפטרו 37,794 אנשים בגיל +65, שהם 82.2% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. חלקם של בני 65-74 מסך הפטירות הוא 21.0%, חלקם של בני 75-84 מסך הפטירות הוא 31.6% וחלקם של בני +85 מסך הפטירות הוא 47.4% (לוח 2.10א).

- עם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב, לחץ-דם ומחלות כלי דם (יתר לחץ-דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם) בסיבות הפטירה: מ-18.6% בקרב בני 65-74 ל-28.1% בקרב בני +85. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-37.9% בקרב בני 65-74 ל-15.1% בקרב בני +85. חלקה היחסי של דמנציה בסיבות הפטירה הוא 5.8% בקרב בני +65 ועולה עם הגיל מ-1.1% בקרב בני 65-74 ל-9.0% בקרב בני +85 (לוח 2.10א).

♦ בשנת 2018 נרשמו 83 **התאבדויות** של גברים בני +65 ו-23 התאבדויות של נשים בנות +65. אחוז ההתאבדויות של בני +65 מכלל ההתאבדויות באוכלוסייה ירד מ-30.8% ב-1981 ל-23.6% ב-2018 (לוח 2.11).

♦ על פי הסקר החברתי, 59.4% מבני +65 מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד** (נתון ממוצע לתקופה 2018-2020). בקרב בני +65, 63.5% מהגברים ו-55.9% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 10.9% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל-לא-טוב (לוח 2.12).

♦ בשנת 2019 נרשמו 17,773 **מקרים חדשים של שאתות ממאירות** בקרב בני +65, אשר מהווים 1,653 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים בני +65 גבוה יותר מאשר בקרב הנשים בנות +65 (1,948 לעומת

1,417 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.13).

- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים: 1,970 לעומת 1,725 לכל 100,000 נפש. גם שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,459 לעומת 960 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.14). בשנת 2018 שיעור המקרים החדשים בקרב יהודים ילידי אירופה-אמריקה היה גבוה מאשר בקרב יהודים ילידי אסיה, אפריקה או ישראל, בקרב גברים ונשים (לוח 2.15).

◆ לפי נתוני הסקר החברתי, ¹(2020), אומדן בני 65+ הגרים בקהילה ומוגבלים **בביצוע** (מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע) פעולות הקשורות למשק הבית (כגון נקיון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית) עומד על 222 אלף איש והם מהווים 20.8% מבני 65+ הגרים בקהילה. שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 12.5% בקרב בני 65-74 לעומת 37.0% בקרב בני 75+. מספרם של בני 65+ המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב-247 אלף איש (23.1% מבני 65+ הגרים בקהילה). שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 65-74 עומד על 15.7% ובקרב בני 75+ על 37.7%. מספר בני 65+ המוגבלים בביצוע פעולות מתחום הטיפול האישי, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב-95 אלף איש והם מהווים 8.9% מבני 65+ הגרים בקהילה (4.3% בקרב בני 65-74 ו-17.8% בקרב בני 75+). 63 אלף איש מוגבלים בראייה ו-60 אלף איש בשמיעה בקרב בני 65+ (5.9% ו-5.6% בהתאמה). שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו גבוה בקרב הערבים לעומת היהודים ואחרים. למשל, 51.2% בקרב הערבים מוגבלים בביצוע פעולות הקשורות למשק הבית לעומת 17.8% בקרב יהודים ואחרים (לוח 2.17).

◆ בשנת 2020 נפגעו **בתאונות דרכים** 1,936 בני 65+. מתוכם, 70 נהרגו (3.6% מבני 65+ שנפגעו), 382 נפצעו קשה (19.7%) ו-1,484 נפצעו קל (76.7%). 32.6%

1 בשל מגיפת הקורונה נערכו מרבית הראיונות של הסקר החברתי בשנת 2020 בטלפון ולא פנים אל פנים, שלא כפי שהיה נהוג בשנים קודמות; כמו כן, בסקר לא נכללה אוכלוסיית הבדואים במחוז דרום. יש להביא שינויים אלו בחשבון בעת השוואת הנתונים לנתוני שנים קודמות.

מבני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 42.4% נהגו ברכב ו-19.8% נסעו ברכב (לוח 2.18).

- שיעור בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2020 עומד על 174 ל-100,000 נפש ושיעור ההרוגים מקרבם הוא 6 ל-100,000 נפש. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב בני 65+ (לוח 2.19). שיעור בני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים ושיעור ההרוגים מתוכם היו בתהליך ירידה מאז שנות התשעים ובעשור האחרון נמצאים במגמה לא אחידה (לוח 2.20).

- שיעור הנהגים בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2020 הוא 34 ל-10,000 נהגים. בסה"כ היו 2,009 נהגים בני 65+ מעורבים בתאונות מתוכן 49 תאונות קטלניות (לוח 2.21).

♦ מתוך כלל הביקורים במחלקות לרפואה דחופה (חדרי מיון) בשנת 2020, 23.5% היו של בני 65+. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 360.3 בקרב בני 65-74; 571.3 בקרב בני 75-84 ו-841.6 בקרב בני 85+. 21.7% מהביקורים של בני 65+ היו ביקורים חוזרים (ביקורים חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) (לוח 2.22).

♦ שיעורי האשפוז של בני 65+ במחלקות האשפוז הכלליות בשנת 2020 היו 351 אשפוזים ל-1,000 בני 65+. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-270 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-590 בגיל 85+). מאז שנת 2000 נמצאים שיעורי האשפוז של בני 65+ במגמת ירידה (לוח 2.23).

- בבחינת שיעור האשפוז של בני 65+ מכלל האשפוזים נמצא כי בשנת 2020 37.0% מהאשפוזים היו של בני 65+ (המהווים כ-12.0% מכלל האוכלוסייה), ו-20.0% מהאשפוזים היו של בני 75+ (המהווים כ-4.8% מכלל האוכלוסייה); (לוח 2.24). חלקם של בני 65+ מתוך כלל האשפוזים במחלקות טיפול נמרץ נשימתי, פנימית, עיניים, כירורגיה כלי דם וטיפול נמרץ קורונה גבוה במיוחד (ללא גריאטריה); (לוח 2.25).

- התפלגות האשפוזים של בני 65+ במחלקות האשפוז מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה 40.8% מהאשפוזים (לוח 2.26).

- השהייה הממוצעת של בני 65+ בכלל המחלקות הכלליות בשנת 2020 הייתה 5.0 ימים. המחלקות שבהן משך השהייה של בני 65+ הוא הארוך ביותר הן השתלת מוח עצם, טיפול נמרץ קורונה וגריאטרייה חריפה (לוח 2.27).

♦ בשנת 2020 נערכו 107,492 ביקורים של בני 65+ במרפאות בתי החולים לשם קבלת טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי. הביקורים שנערכו על ידי בני 65+ מהווים 9.5% מכלל הביקורים. שיעור הביקורים לאלף נפש של בני 65+ נמוך מזה של כלל האוכלוסייה: 95.3 ו-122.2, בהתאמה (לוח 2.28).

♦ בסוף 2020 היו 273 בני 65+ מאושפדים באשפוז פסיכיאטרי, שיעור של 0.2 מאושפדים לאלף נפש. 8.7% מכלל המאושפדים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.30). משנת 1990 ועד שנת 2020 חלה ירידה בשיעור בני 65+ המאושפדים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.2 ל-1,000 נפש); (לוח 2.31).

- במהלך 2020 היו 1,641 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+, ואלה היוו 7.4% מסך הקבלות לאשפוז. 52.0% מהקבלות של בני 65+ היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (74.0% מכלל האשפוזים של בני 65+); (לוח 2.32). שתי האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (77.8% מהקבלות) היו: סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות והפרעות אפקטיביות (לוח 2.33).

- 7.8% מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא בשנת 2020 היו של בני 65+ (לוח 2.34).

♦ בנובמבר שנת 2020 היו 57.9% מבני 65+ מבוטחים בשירותי בריאות כללית, 24.9% במכבי שירותי בריאות, 7.1% בקופת חולים לאומית ו-10.1% בקופת חולים מאוחדת. יש ירידה לאורך השנים באחוז בני 65+ המבוטחים בשירותי בריאות כללית. אחוז המבוטחים בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקנים המבוגרים יותר ועומד על 67.1% בקרב בני 85+ (לוח 2.35). 14.0% מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם בני 65+, 11.6% במכבי שירותי

בריאות, 11.4% בקופת חולים לאומית ו-9.2% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.36).

הגדרות והסברים

כלל האוכלוסייה: המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "ערבים" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ. עד שנת 2002 לא נכללו מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל. החל מ-2002 נכללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל פחות משנה.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אומדני המוגבלות בקרב בני 65+ הגרים בקהילה מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בשנת 2020 בסקר החברתי של הלמ"ס. בשל מגיפת הקורונה נערכו מרבית הראיונות של הסקר החברתי בשנת 2020 בטלפון ולא פנים אל פנים, שלא כפי שהיה נהוג בשנים קודמות; כמו כן,

בסקר לא נכללה אוכלוסיית הבדואים במחוז דרום. יש להביא שינויים אלו בחשבון בעת השוואת הנתונים לנתוני שנים קודמות.

רישום השאתות הממאירות נעשה על ידי הרישום הלאומי לסרטן במרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות וכולל גם גידולים ממוקדים וחודרניים.

דמנציה: הנתונים על שכיחות דמנציה באוכלוסייה מבוססים על 'סקר הימצאות' שנעשה על ידי המרכז הארצי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות, כחלק מפעולות התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות ומניעתן. הסקר נערך על ידי שליפת נתונים מהתיק הרפואי הממוחשב של מבוטחי קופה פעילים בשנת 2016, בני 45 ומעלה, בארבע קופות החולים, לפי 'הגדרת מקרה', על בסיס תיעוד של אבחנה או של רכישת תרופות הנמצא בתיק הרפואי. מבוטח הוגדר כחולה בדמנציה (אי-פעם) אם ענה לפחות על אחד משלושת התנאים האלה: 1. קיים בתיקו תיעוד אבחנה של דמנציה מתוך רשימת האבחנות הקבועות / פעילות / כרוניות לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9; 2. רופא מומחה (משפחה / פנימי / גריאטר / פסיכיאטר / נוירולוג) תיעד בתיקו קוד אבחנה של דמנציה לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9, בלפחות שתי אבחנות ביקור בתקופה של עד 12 חודשים (לצורך הגדרה כחולה, שני הביקורים יכולים להיות אצל רופאים שונים); 3. המבוטח רכש אי-פעם תרופות כנגד דמנציה.

שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-25%-50%. בהתאם לכך ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. משרד הבריאות עומד לפרסם דו"ח מלא בנושא זה בקרוב. לפרטים ראו ברשימת הביבליוגרפיה.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת סך-כל המחלקות הכלליות אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

אשפוז פסיכיאטרי: אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

אשפוז מלא: מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

אשפוז יום: מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

קבלות: קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

קבלות ראשונות: קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים
.. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-30%
() = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 15% ל-30%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומכון מאירס-ג'וינט-ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		שנה
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995

ערבים		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		שנה
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000
78.6	74.9	82.6	78.7	82.2	78.2	2005
78.5	75.1	83.0	79.2	82.5	78.7	2006
78.8	75.2	82.8	79.2	82.4	78.7	2007
79.6	75.7	83.3	79.5	83.0	79.0	2008
80.8	76.4	83.7	80.1	83.3	79.6	2009
81.3	76.6	83.9	80.3	83.6	79.7	2010
81.1	76.9	84.5	80.7	84.1	80.1	2015
81.3	77.2	84.7	81.3	84.2	80.7	2016
81.9	77.5	85.0	81.2	84.6	80.6	2017
82.3	78.0	85.2	81.5	84.8	80.9	2018
81.9	78.1	85.1	81.5	84.7	81.0	2019
81.5	76.6	85.3	81.4	84.8	80.7	2020

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת החיים בגיל 65, לפי דת ומין

ממוצע לתקופה

ערבים*		יהודים		כלל האוכלוסייה		שנים
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
17.2	16.6	18.6	16.4	18.5	16.4	1999-1995
17.2	16.0	19.8	17.7	19.7	17.5	2004-2000
17.8	16.1	20.7	18.6	20.5	18.4	2009-2005
19.1	17.0	21.4	19.3	21.2	19.0	2014-2010
19.5	17.3	22.0	19.7	21.8	19.4	2015-2019
19.6	17.1	22.1	19.8	21.9	19.5	2020-2016

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

* עד 1995, בני דתות אחרות

לוח 2.3: תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין

ממוצע לתקופה

שנים	בגיל 75		בגיל 80		בגיל 85		בגיל 95	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1979-1975	8.5	9.2	6.5	6.9	4.9	5.1	..	..
1984-1980	8.7	9.3	6.6	6.8	4.6	4.9	..	..
1989-1985	9.2	10.0	6.7	7.4	5.0	5.4	..	..
1994-1990	9.6	10.7	7.3	8.0	5.4	5.8	..	..
1999-1995	10.1	11.1	7.5	8.1	5.6	5.8	..	..
2004-2000	11.0	12.1	8.5	9.0	6.5	6.5	..	..
2009-2005	11.5	12.6	8.7	9.4	6.6	6.8	..	..
2014-2010	11.8	13.1	8.8	9.6	6.7	7.2	3.4	3.3
2019-2015	12.0	13.6	9.0	10.0	6.6	7.2	3.4	3.4
2020-2016	12.1	13.6	9.0	10.0	..	..	..	..

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: תוחלת החיים בלידה ובגיל 65, ביישובים*, 2015-2019

ממוצע לתקופה

בגיל 65			בלידה			יישוב
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
		22.6			86.0	מודיעין-מכבים-רעות
		23.0			85.9	הוד השרון
		22.4			85.5	נס ציונה
		22.4			85.2	גבעתיים
		22.7			85.1	רעננה
		22.4			85.1	מודיעין עילית
23.1	20.9	22.1	86.2	82.9	84.7	כפר סבא
23.4	20.4	22.1	86.6	82.4	84.7	רמת גן
		21.8			84.5	הרצלייה
23.0	20.8	22.0	86.0	82.5	84.3	רחובות
23.0	20.3	21.7	86.0	82.1	84.1	ראשון לציון
		21.2			83.6	ראש העין
22.3	19.9	21.2	85.1	81.6	83.5	פתח תקווה
22.4	19.8	21.2	85.0	81.6	83.4	בני ברק
23.0	20.1	21.6	85.4	81.0	83.3	ירושלים
22.2	19.7	21.0	84.9	80.9	83.0	תל אביב-יפו
22.5	20.0	21.4	85.0	80.6	82.9	חיפה
22.3	19.7	21.1	84.8	80.9	82.9	נתניה
21.7	19.0	20.5	84.6	80.8	82.8	חולון
20.8	20.0	20.4	83.9	81.5	82.6	בית שמש
21.8	19.2	20.7	84.5	80.2	82.4	אשדוד
21.7	19.5	20.7	84.1	80.1	82.2	אשקלון
		20.2			82.0	חדרה
		19.2			82.0	ביתר עילית
		19.6			81.6	נהריה
		19.6			81.4	קריית אתא
		19.6			81.4	עפולה
21.4	18.7	20.2	83.7	78.8	81.3	באר שבע



לוח 2.4: תוחלת החיים בלידה ובגיל 65, ביישובים*, 2015-2019 (המשך)

ממוצע לתקופה

יישוב	בלידה			בגיל 65	
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים
רמלה	81.2			20.1	
בת ים	81.2	78.8	83.4	19.9	18.4
קריית גת	81.0			19.4	
לוד	80.8			20.1	
נצרת	80.6			19.2	
אילת	80.5			19.2	
רהט	79.5			18.8	
אום אל-פחם	78.9			17.4	

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי חברתי של יישובים בישראל, 2014-2020
 * יישובים שמנו מעל 50,000 תושבים בסוף 2019. ממוין לפי סדר יורד של תוחלת החיים בלידה

לוח 2.5: פטירות של בני 65+, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2019

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

גיל	סה"כ			יהודים ואחרים ⁽¹⁾			ערבים	
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים
בני 65+	35	37	34	35	37	33	38	41
בני 65-69	10	12	8	9	12	7	14	18
בני 70-74	16	20	12	15	19	12	25	29
בני 75+	69	73	66	69	73	66	72	75
בני 75-79	29	36	24	27	34	22	45	52
בני 80-84	51	60	45	50	59	43	71	76
בני 85+	139	145	135	139	145	135	139	142
בני 85-89	101	111	94	100	110	93	117	119
בני 90-95	180	190	174	179	190	173	185	180
בני 95+	253	248	255	258	251	261	172	205
שיעורים מתוקננים לבני 65 ⁽²⁾	36	40	31	35	39	31	45	49

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)

2. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל בשנת 2019

לוח 2.6: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2019

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

מאפיינים		65+		בני 74-65			בני 75+	
				סה"כ	69-65	74-70	סה"כ	79-75
								80+
סה"כ		39		14	11	17	75	32
גברים		41		17	14	22	80	40
נשים		37		11	8	14	71	26
סה"כ ילידי ישראל⁽²⁾		33		15	12	23	82	45
גברים		35		19	15	27	87	52
נשים		30		12	10	19	78	39
סה"כ ילידי אסיה		42		13	9	15	67	28
גברים		46		16	9	19	74	36
נשים		39		10	8	11	61	21
סה"כ ילידי אפריקה		35		14	10	17	63	29
גברים		38		18	13	23	67	36
נשים		33		10	8	13	59	23
סה"כ ילידי אירופה-אמריקה		43		13	10	15	79	28
גברים		45		16	13	19	84	36
נשים		41		10	7	12	76	23
מזה: עולי בריה"מ לשעבר⁽³⁾		38		13	10	16	70	29
גברים		42		18	15	21	78	39
נשים		35		9	7	12	65	24

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.7: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
2010			
בני 65+	68.2	69.7	66.9
בני 65-74	71.5	70.8	72.2
בני 75+	67.5	69.4	66.0
בני 0-64	62.7	58.0	70.4
כלל האוכלוסייה	67.1	66.7	67.5
2015			
בני 65+	66.3	68.4	64.4
בני 65-74	70.8	70.0	72.0
בני 75+	65.3	67.9	63.1
בני 0-64	65.0	61.6	70.9
כלל האוכלוסייה	66.1	66.8	65.3
2019			
בני 65+	62.4	64.8	60.3
בני 65-74	67.6	67.9	67.1
בני 75+	61.0	63.7	58.9
בני 0-64	63.2	60.3	68.2
כלל האוכלוסייה	62.6	63.8	61.3
2020			
בני 65+	60.8	63.7	58.1
בני 65-74	66.8	67.5	65.5
בני 75+	59.2	62.3	56.7
בני 0-64	62.6	59.5	68.2
כלל האוכלוסייה	61.1	62.8	59.4

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות

* חלק מבתי חולים למחלות ממושכות וכן מיטות סיעודיות בבתי אבות לא נכללו בחישוב אחוז הפטירות בבתי חולים, ולכן האחוז בפועל גבוה יותר בכ-10% מהנתון הרשום בלוח

לוח 2.8: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2019

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני 65+		סה"כ	סיבות פטירה
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים		
504	512	511	3,354	3,718	3,516	סה"כ*
27	26	27	192	208	199	מחלות זיהומיות
128	132	130	743	949	835	שאתות ממאירות
28	26	27	199	204	201	סוכרת
32	17	24	241	157	204	דמנציה
10	7	8	78	55	68	יתר לחץ-דם
11	13	12	81	96	88	אוטם חריף של שריר הלב
23	33	28	172	273	217	מחלת לב איסכמית אחרת
37	31	34	266	243	256	מחלות לב אחרות
26	23	25	184	193	188	מחלות של כלי דם במוח
4	5	5	30	42	35	טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
17	17	17	121	143	131	דלקת ריאות
14	16	15	95	131	111	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
17	17	17	125	137	130	יתר מחלות מערכת הנשימה
4	5	4	24	27	26	מחלות כבד
16	18	17	113	150	130	מחלות כליה
27	36	32	171	189	179	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
65	57	62	449	425	438	כל המחלות האחרות
2	6	4	6	10	8	תאונות דרכים
2	7	5	5	14	9	פגיעה עצמית מכוונת
9	15	12	57	72	64	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.9: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2019

שיעורים ל-100,000 נפש

סיבות פטירה	גברים			נשים		
	74-65	84-75	85+	74-65	84-75	85+
סה"כ*	1,552	4,629	14,486	972	3,362	13,465
מחלות זיהומיות	80	270	818	49	207	768
שאתות ממאירות	542	1,299	2,490	410	883	1,858
סוכרת	94	259	730	58	219	754
דמנציה	21	155	994	11	162	1,393
יתר לחץ-דם	13	47	330	13	54	405
אוטם חריף של שריר הלב	47	111	361	18	72	375
מחלת לב איסכמית אחרת	91	322	1,250	25	145	856
מחלות לב אחרות	74	272	1,195	47	235	1,263
מחלות של כלי דם במוח	75	260	740	46	178	780
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	17	57	152	7	27	135
דלקת ריאות	36	154	767	18	123	556
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	59	190	414	27	104	365
יתר מחלות מערכת הנשימה	37	180	633	23	123	563
מחלות כבד	22	39	27	14	38	40
מחלות כליה	49	171	715	25	115	484
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	103	201	679	55	148	714
כל המחלות האחרות	152	523	1,833	106	460	1,880
תאונות דרכים	7	16	10	4	10	6
פגיעה עצמית מכוונת	11	19	18	3	7	9
כל הסיבות החיצוניות האחרות	24	86	328	11	54	258

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * ההסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2019

סיבות פטירה	קבוצת גיל				כלל האוכלוסייה
	85+	84-75	74-65	65+	
סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*	17,909	11,933	7,952	37,794	46,002
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
מחלות זיהומיות	5.7	6.0	5.1	5.7	5.3
שאתות ממאירות	15.1	27.2	37.9	23.7	25.5
סוכרת	5.4	6.1	6.0	5.7	5.3
דמנציה	9.0	4.1	1.2	5.8	4.8
יתר לחץ-דם	2.7	1.3	1.1	1.9	1.7
אוטם חריף של שריר הלב	2.7	2.3	2.5	2.5	2.4
מחלת לב איסכמית אחרת	7.3	5.7	4.5	6.2	5.5
מחלות לב אחרות	8.9	6.4	4.8	7.3	6.6
מחלות של כלי דם במוח	5.5	5.5	4.8	5.3	4.8
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
דלקת ריאות	4.6	3.5	2.1	3.7	3.3
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	2.8	3.6	3.4	3.2	2.9
יתר מחלות מערכת הנשימה	4.3	3.8	2.4	3.7	3.3
מחלות כבד	0.3	1.0	1.4	0.7	0.9
מחלות כליה	4.1	3.6	2.9	3.7	3.3
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	5.1	4.4	6.3	5.1	6.2
כל המחלות האחרות	13.4	12.5	10.3	12.5	12.0
תאונות דרכים	0.1	0.3	0.4	0.2	0.8
פגיעה עצמית מכוונת	0.1	0.3	0.6	0.3	0.9
כל הסיבות החיצוניות האחרות	2.1	1.7	1.4	1.8	2.3

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ ושל כלל הגברים, לפי גיל, 2019

סיבות פטירה	כלל הגברים	קבוצת גיל			
		85+	84-75	74-65	65+
סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*	23,006	7,067	6,105	4,624	17,796
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
מחלות זיהומיות	5.2	5.7	5.6	5.7	5.6
שאתות ממאירות	25.7	22.2	25.5	23.7	25.5
סוכרת	5.0	5.9	5.5	5.7	5.5
דמנציה	3.3	7.2	4.2	5.8	4.2
יתר לחץ-דם	1.3	2.3	1.5	1.9	1.5
אוטם חריף של שריר הלב	2.6	2.4	2.6	2.5	2.6
מחלת לב איסכמית אחרת	6.4	5.1	7.3	6.2	7.3
מחלות לב אחרות	6.0	7.9	6.5	7.3	6.5
מחלות של כלי דם במוח	4.6	5.5	5.2	5.3	5.2
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1
דלקת ריאות	3.2	3.6	3.8	3.7	3.8
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	3.2	2.8	3.5	3.2	3.5
יתר מחלות מערכת הנשימה	3.2	3.7	3.7	3.7	3.7
מחלות כבד	1.0	(0.7)	0.7	0.7	0.7
מחלות כליה	3.5	3.4	4.0	3.7	4.0
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	7.0	5.1	5.1	5.1	5.1
כל המחלות האחרות	11.1	13.4	11.4	12.5	11.4
תאונות דרכים	1.2	(0.2)	0.3	0.2	0.3
פגיעה עצמית מכוונת	1.4	(0.1)	0.4	0.3	0.4
כל הסיבות החיצוניות האחרות	2.9	1.7	1.9	1.8	1.9

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10ג: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות 65+ ושל כלל הנשים, לפי גיל, 2019

סיבות פטירה	כלל הנשים	קבוצת גיל			
		85+	84-75	74-65	65+
סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*	22,996	10,842	5,828	3,328	19,998
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
מחלות זיהומיות	5.4	5.4	5.2	5.3	5.7
שאתות ממאירות	25.4	25.4	25.7	25.5	22.2
סוכרת	5.6	5.6	5.0	5.3	5.9
דמנציה	6.3	6.3	3.3	4.8	7.2
יתר לחץ-דם	2.0	2.0	1.3	1.7	2.3
אוטם חריף של שריר הלב	2.2	2.2	2.6	2.4	2.4
מחלת לב איסכמית אחרת	4.6	4.6	6.4	5.5	5.1
מחלות לב אחרות	7.3	7.3	6.0	6.6	7.9
מחלות של כלי דם במוח	5.1	5.1	4.6	4.8	5.5
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9
דלקת ריאות	3.3	3.3	3.2	3.3	3.6
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	2.7	2.7	3.2	2.9	2.8
יתר מחלות מערכת הנשימה	3.5	3.5	3.2	3.3	3.7
מחלות כבד	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7
מחלות כליה	3.2	3.2	3.5	3.3	3.4
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	5.4	5.4	7.0	6.2	5.1
כל המחלות האחרות	13.0	13.0	11.1	12.0	13.4
תאונות דרכים	0.4	0.4	(1.2)	(0.8)	0.2
פגיעה עצמית מכוונת	0.4	0.4	(1.4)	(0.9)	0.1
כל הסיבות החיצוניות האחרות	1.8	1.8	2.9	2.3	1.7

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.11: התאבדויות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות

שנה	65+		74-65		75+		כלל האוכלוסייה	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
מספרים מוחלטים								
1981	34	31	24	22	10	9	132	79
1990	59	26	30	14	29	12	220	84
2000	58	28	19	15	39	13	307	87
2005	55	33	20	10	35	23	304	121
2010	73	23	33	14	40	9	394	86
2015	52	25	22	11	30	14	269	73
2016	72	11	39	8	33	3	321	69
2017	76	28	38	10	38	18	305	97
2018	83	23	43	14	40	9	354	95

אחוזים מכלל ההתאבדויות					
שנה	64-0	74-65	75+	סה"כ	65+
1981	69.2	21.8	9.0	100.0	30.8
1990	72.0	14.5	13.5	100.0	28.0
2000	78.2	8.6	13.2	100.0	21.8
2005	79.3	7.1	13.6	100.0	20.7
2010	80.0	9.8	10.2	100.0	20.0
2015	77.5	9.6	12.9	100.0	22.5
2016	78.7	12.1	9.2	100.0	21.3
2017	74.1	11.9	13.9	100.0	25.9
2018	76.4	12.7	10.9	101.0	23.6

מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל

לוח 2.12: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, ממוצע לתקופה 2018-2020

אחוזים, ממוצע לתקופה

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
סה"כ בני 65+	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	17.6	19.1	16.4
טוב	41.8	44.4	39.5
לא כל כך טוב	29.7	26.5	32.3
בכלל לא טוב	10.9	10.0	11.7
כלל האוכלוסייה*	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	56.0	57.6	54.5
טוב	28.9	28.2	29.5
לא כל כך טוב	11.3	10.6	12.0
בכלל לא טוב	3.8	3.6	4.0
דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאוד בדרך כלל			
סה"כ בני 65+	59.4	63.5	55.9
גיל			
74-65	66.7	69.2	64.5
75+	46.3	52.8	41.2
כלל האוכלוסייה*	84.9	85.8	84.0

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.13: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2019

סוף שנה

מאפיינים	65+	74-65	84-75	85+	כלל האוכלוסייה	כלל
מספרים מוחלטים	17,773	9,430	5,794	2,549	31,817	
שיעורים ל-100,000 נפש	1,653	1,473	1,898	1,971	351	
מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים
שיעורים ל-100,000 נפש	1,653	1,948	1,417	9	324	378
מזה: קיבה	46	59	35	8	9	7
מעג גס וחלחולת	174	202	152	33	34	31
ריאה	177	240	126	31	38	24
שד	217	6	387	60	1	117
ערמונית		396			55	
שלפוחית השתן	121	219	43	20	32	8
לימפומה ממארת	81	91	72	19	21	18

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

לוח 2.14: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	2006	2010	2015	2017	2018	2019
גברים						
סה"כ יהודים ואחרים*	2,309	2,287	2,006	1,926	2,066	1,970
מזה: קיבה	91	91	74	67	61	60
מעג גס וחלחולת	379	307	248	222	225	203
ריאה	231	252	242	225	238	228
שד						6
עירונית	556	559	377	367	437	411
שלפוחית השתן	236	239	222	202	232	219
לימפומה ממארת	111	97	103	101	103	93
ליקמיה	58	62	46	47	44	
סה"כ ערבים	2,062	2,286	1,628	1,700	1,673	1,725
מזה: קיבה	101	57	37	52	79	47
מעג גס וחלחולת	229	305	210	232	223	185
ריאה	392	449	401	381	381	364
שד						7
עירונית	353	354	248	253	240	244
שלפוחית השתן	309	255	193	178	203	218
לימפומה ממארת	95	82	66	65	82	73
ליקמיה	66	73	43	29	27	
נשים						
סה"כ יהודיות ואחרות*	1,468	1,578	1,562	1,443	1,475	1,459
מזה: קיבה	47	47	39	37	36	34
מעג גס וחלחולת	243	222	198	167	166	153
ריאה	85	111	126	127	133	132
שד	343	394	442	385	412	402
שחלה	40	36	41	34	29	
שלפוחית השתן	37	38	44	36	40	45
לימפומה ממארת	76	67	86	80	82	75
ליקמיה	31	31	34	31	27	
סה"כ ערביות	995	1,181	1,078	916	1,023	960
מזה: קיבה	52	34	25	37	44	44
מעג גס וחלחולת	151	202	169	183	136	147
ריאה	48	58	78	55	65	63
שד	219	205	282	194	276	224
שחלה				15	23	
שלפוחית השתן	18	12	29	22	23	18
לימפומה ממארת				59	81	44
ליקמיה				35	8	

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.15: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2018

סוף שנה

מאפיינים	65+	69-65	74-70	75+
מספרים מוחלטים				
סה"כ יהודים בני 65+	15,994	4,179	4,103	7,712
גברים	8,404	2,210	2,263	3,931
נשים	7,590	1,969	1,840	3,781
שיעורים ל-100,000 נפש				
גברים				
ילידי ישראל	1,792	1,405	2,057	2,416
ילידי אירופה-אמריקה	2,091	1,593	1,889	2,538
ילידי אסיה	1,948	1,583	1,886	2,119
ילידי אפריקה	1,875	1,366	1,955	2,190
נשים				
ילידות ישראל	1,393	1,202	1,470	1,693
ילידות אירופה-אמריקה	1,518	1,152	1,389	1,766
ילידות אסיה	1,375	1,285	1,257	1,458
ילידות אפריקה	1,245	1,458	1,129	1,257

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות

לוח 2.16: הימצאות דמנציה⁽¹⁾ בקרב בני 45+ לפי גיל ומין, 2016

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
54-45	321	153	168
64-55	1,963	1,037	926
74-65	7,560	3,927	3,933
84-75	25,124	9,162	15,962
85+	30,983	9,709	21,274
סה"כ 65+	63,667	22,798	41,169
שיעורים ל-100 נפש			
54-45	0.0	0.0	0.0
64-55	0.3	0.3	0.2
74-65	1.4	1.4	1.3
84-75	8.4	7.1	9.3
85+	22.1	18.2	24.5
סה"כ 65+	6.4	5.3	7.4
שיעורים מתוקננים לגיל⁽²⁾			
בני 45 ומעלה	2.3	2.8	
בני 65 ומעלה	5.4	6.7	

מקור: נתונים שהתקבלו מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות

1. הנתונים מבוססים על סקר שנערך בקרב מבוטחי ארבע קופות החולים. שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-50%-25%. בהתאם לכך, ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. לפרטים נוספים ראו במבוא

2. שיעורים מתוקננים לגיל מאפשרים להשוות בין קבוצות שהתפלגות הגיל שלהן שונה. השיעורים המתוקננים מציגים את הנתונים כאילו התפלגות הגיל בקבוצות אלו הייתה זהה. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל 2016

לוח 2.17: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2020

אחוזים, ממוצע שנתי

להתלבש או להתרחץ			ללכת או לעלות במדרגות			סה"כ	סה"כ באלפים ⁽¹⁾	מאפיינים
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
8.9	11.5	79.6	23.1	16.5	60.4	100.0	1,067.3	סה"כ בני 65+
גיל								
4.3	8.2	87.5	15.7	15.4	68.9	100.0	707.7	בני 65-74
17.8	18.0	64.2	37.7	18.6	43.7	100.0	359.6	בני 75+
מין								
7.2	8.9	83.9	18.0	14.3	67.8	100.0	483.9	גברים
10.3	13.7	76.0	27.4	18.3	54.3	100.0	583.4	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
7.2	10.3	82.5	20.7	16.1	63.3	100.0	974.2	יהודים ואחרים
מזה: עולי בריה"מ לשעבר								
11.7	14.9	73.5	25.3	21.1	53.6	100.0	201.1	מזה: עולי בריה"מ לשעבר
26.6	24.1	49.4	48.4	20.8	30.8	100.0	93.1	ערבים
לזכור או להתרכז			פעולות הקשורות למשק הבית ⁽³⁾			סה"כ	סה"כ באלפים	
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
4.3	27.5	68.3	20.8	13.4	65.9	100.0	1,067.3	סה"כ בני 65+
גיל								
1.8	23.9	74.2	12.5	12.8	74.7	100.0	707.7	בני 65-74
9.1	34.4	56.5	37.0	14.5	48.5	100.0	359.6	בני 75+
מין								
4.4	25.1	70.6	14.2	11.8	73.9	100.0	483.9	גברים
4.2	29.4	66.4	26.2	14.6	59.2	100.0	583.4	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
3.9	26.5	69.6	17.8	13.1	69.0	100.0	974.2	יהודים ואחרים
מזה: עולי בריה"מ לשעבר								
6.1	30.4	63.5	22.9	18.3	58.8	100.0	201.1	מזה: עולי בריה"מ לשעבר
8.6	37.4	54.0	51.2	15.9	32.9	100.0	93.1	ערבים

לוח 2.17: אומדן בני +65 הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2020 (המשך)

אחוזים, סוף שנה

לשמוע ⁽⁵⁾			לראות ⁽⁴⁾			סה"כ	סה"כ באלפים ⁽¹⁾	מאפיינים
יש קושי (2)	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי (2)	יש קושי מועט	אין קושי			
5.6	26.1	68.3	5.9	18.7	75.4	100.0	1,067.3	סה"כ בני +65
גיל								
2.5	21.4	76.1	2.7	15.4	81.9	100.0	707.7	בני 65-74
11.9	35.3	52.8	12.2	25.2	62.6	100.0	359.6	בני +75
מין								
6.6	29.4	64.0	3.9	15.2	80.9	100.0	483.9	גברים
4.7	23.5	71.8	7.5	21.5	71.0	100.0	583.4	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
5.5	26.5	68.0	5.6	17.6	76.8	100.0	974.2	יהודים ואחרים
6.4	23.2	70.4	6.8	22.0	71.2	100.0	201.1	מזרח: עולי בריה"מ לשעבר
7.2	21.5	71.3	8.6	29.8	61.1	100.0	93.1	ערבים

מקור: מקור: למ"ס, עיבוד על נתוני הסקר החברתי לשנת 2020

1. אוכלוסיית הסקר החברתי לשנת 2020. בשל מגיפת הקורונה, נערכו מרבית הראיונות של הסקר החברתי בשנת 2020 בטלפון ולא פנים אל פנים, שלא כפי שהיה בשנים קודמות; כמו כן, בסקר לא נכללה אוכלוסיית הבדואים במחוז דרום. יש להביא שינויים אלו בחשבון בעת השוואת הנתונים לנתוני שנים קודמות
2. כולל אלה שאינם יכולים כלל לבצע את הפעולה/תפקוד
3. כגון: נקיון, קניות וסידורים מחוץ לבית
4. גם כאשר מרכיב/ה משקפיים
5. גם כאשר מרכיב/ה מכשיר שמיעה

לוח 2.18: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2020

מספרים מוחלטים

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	1,936	70	382	1,484
גברים	1,112	46	218	848
נשים	824	24	164	636
בני 65-74				
סה"כ	1,185	28	204	953
גברים	690	19	124	547
נשים	495	9	80	406
בני 75+				
סה"כ	751	42	178	531
גברים	422	27	94	301
נשים	329	15	84	230
בני 65+ לפי מעמד הנפגע				
הולך רגל	631	38	166	427
נהג רכב	820	21	108	691
נוסע ברכב	384	7	63	314
אחר	101	4	45	52
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	1,656	54	333	1,269
ערבים	194	7	38	149
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	18,226	305	2,072	15,849
גברים	11,351	231	1,557	9,563
נשים	6,875	74	515	6,286

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים
 * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.19: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2020

שיעורים ל-100,000 נפש

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	174	6	34	134
גברים	225	9	44	171
נשים	134	4	27	103
בני 65-74				
סה"כ	178	4	31	143
גברים	223	6	40	177
נשים	139	3	22	114
בני 75+				
סה"כ	168	9	40	119
גברים	227	14	50	162
נשים	127	6	32	89
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	163	5	33	125
ערבים	198	7	39	152
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	198	3	22	172
גברים	248	5	34	209
נשים	148	2	11	135

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים
 * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.20: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש

שנה	סה"כ נפגעים		מזה : הרוגים	
	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה
1985	378	442	24	9
1990	459	594	23	9
2001	219	584	12	8
2002	290	581	16	8
2003	273	554	12	7
2004	283	542	13	7
2005	277	512	12	6
2006	295	509	12	6
2007	278	457	11	6
2008	275	435	11	6
2009	249	425	8	4
2010	250	368	10	5
2011	253	349	8	4
2012	226	302	7	3
2013	249	301	6	3
2014	225	267	7	3
2015	234	264	11	4
2016	232	260	8	4
2017	237	265	9	4
2018	233	259	8	4
2019	236	254	6	4
2020	174	198	6	3

מקורות : למ"ס ; משרד הבריאות

לוח 2.21: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2020

מאפיינים	חומרת התאונות			
	סה"כ	קטלניות	קשות	קלות
מספרים מוחלטים				
נהגים מעורבים בני 65+	2,009	49	343	1,617
גיל				
בני 65-74	1,380	33	233	1,114
בני 75+	629	16	110	503
מין				
גברים	1,608	39	284	1,285
נשים	401	10	59	332
כלל הנהגים המעורבים				
סה"כ⁽¹⁾	18,282	456	2,888	14,938
גברים	13,742	396	2,422	10,924
נשים	4,540	60	466	4,014
שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾				
נהגים מעורבים בני 65+				
סה"כ	34	1	6	27
גברים	44	1	8	35
נשים	17	0	3	14
כלל הנהגים המעורבים				
סה"כ	40	1	6	33
גברים	54	2	10	43
נשים	22	0	2	20

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2019 ובסוף 2020

לוח 2.22: ביקורים וביקורים חוזרים של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2020

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספר ביקורים⁽²⁾ (באלפים)			
סה"כ בני 65+	524.2	251.5	272.7
גיל			
בני 65-74	235.3	122.4	112.9
בני 75-84	177.9	83.6	94.3
בני 85+	111.0	45.5	65.5
כלל האוכלוסייה	2,234.9	1,162.1	1,072.8
אחוז הביקורים של בני 65+ מתוך כלל הביקורים			
	23.5	21.6	25.4
שיעורים לאלף נפש			
סה"כ בני 65+	464.7	500.0	436.3
גיל			
בני 65-74	360.3	404.3	322.0
בני 75-84	571.3	618.5	534.7
בני 85+	841.6	921.8	792.9
כלל האוכלוסייה	239.7	256.3	224.3
ביקורים חוזרים⁽³⁾ בתוך 30 ימים (אחוזים)			
סה"כ בני 65+	21.7	23.2	20.4
גיל			
בני 65-74	20.9	22.3	19.5
בני 75-84	22.2	23.8	20.8
בני 85+	22.6	24.4	21.2
כלל האוכלוסייה	17.0	17.0	17.0

מקור: מקור: "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה - מאפייני הפעילות 2020" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)

1. חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של 29 בתי חולים לאשפוז כללי ללא בתי החולים במזרח ירושלים. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום
2. מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל ביקורים עקב לידה
3. ביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה

לוח 2.23: אשפוזים* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש

מאפיינים	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
בני 65+ סה"כ	494	497	433	422	417	405	400	351
גברים	570	560	491	479	475	459	455	404
נשים	437	449	388	377	372	362	356	308
בני 65-74 סה"כ	397	370	315	308	306	299	298	270
גברים	468	435	372	365	362	355	352	325
נשים	342	316	265	259	257	251	251	222
בני 75+ סה"כ	617	636	581	571	569	557	551	472
גברים	710	715	658	647	647	627	626	536
נשים	553	581	526	517	514	507	497	426
בני 75-84 סה"כ	569	581	519	511	507	495	490	422
גברים	661	660	600	588	586	570	569	490
נשים	503	525	458	453	448	438	430	370
בני 85+ סה"כ	770	775	733	715	719	703	694	590
גברים	877	872	822	809	816	781	779	660
נשים	703	718	680	660	660	655	643	548
כלל האוכלוסייה סה"כ	144	148	138	136	135	134	133	117
גברים	142	143	134	131	131	129	128	114
נשים	146	153	143	141	139	138	137	121

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.24: אשפוזים* של בני 65+ במחלקות כלליות, מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

אחוזים

מאפיינים	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
בני 65+								
סה"כ	34.1	33.3	35.0	35.5	36.2	36.2	36.7	37.0
גברים	34.0	33.8	36.2	36.6	37.4	37.4	38.2	38.6
נשים	34.1	32.9	33.9	34.4	35.1	35.0	35.2	35.4
בני 75+								
סה"כ	18.8	20.3	20.9	20.8	20.9	20.5	20.4	20.0
גברים	18.0	19.3	20.2	20.0	20.1	19.6	19.8	19.3
נשים	19.6	21.3	21.6	21.6	21.6	21.3	21.0	20.7
בני 85+								
סה"כ	5.7	6.9	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.4
גברים	5.1	6.1	6.6	6.6	6.8	6.6	6.7	6.4
נשים	6.3	7.7	8.6	8.5	8.7	8.7	8.6	8.4

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.25: בני 65+ מכלל המאושפזים, לפי מחלקות*, שנים נבחרות

אחוזים

מחלקה	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
כלל המחלקות הכלליות	34.1	33.3	35.0	35.5	36.2	36.2	36.7	37.0
פנימית	58.0	58.9	61.6	62.1	63.1	62.5	62.8	63.0
ריאות	46.1	47.6	51.7	51.7	52.5	55.4	57.3	58.6
גריאטריה חריפה	96.1	95.8	98.6	99.2	99.1	99.2	99.4	98.8
נירולוגיה	33.9	32.1	35.9	37.0	37.7	40.4	41.3	43.4
אונקולוגיה	37.9	38.3	44.2	46.5	47.6	48.8	50.3	53.5
עור ומין	32.1	32.1	37.8	38.6	41.7	38.4	40.8	45.4
השתלת מוח עצם	3.6	8.5	16.6	20.4	19.1	18.9	22.1	19.3
טיפול נמרץ כללי	47.6	48.3	50.0	48.7	50.1	49.7	50.3	50.9
טיפול נמרץ לב	50.4	49.4	52.4	53.4	54.4	55.2	55.9	56.3
טיפול נמרץ נשימתי	73.9	64.4	62.2	61.1	60.3	63.2	60.8	65.1
קורונה								49.4
טיפול נמרץ קורונה								59.6
כירורגיה כללית	27.2	27.2	28.9	29.9	30.7	30.6	31.5	31.5
אורתופדיה	32.4	34.7	36.4	36.6	37.5	38.0	38.5	37.7
אורולוגיה	40.3	37.9	41.5	42.6	43.8	43.7	45.1	44.9
נירוכירורגיה	28.8	33.6	37.3	37.3	38.5	38.7	39.6	40.7
כירורגיה חזה ולב	47.4	47.5	48.0	49.1	50.8	51.3	52.0	51.9
כירורגיה כלי דם	55.8	53.4	55.9	56.2	58.2	60.3	61.0	61.1
כירורגיה פלסטית	28.1	28.1	27.0	27.1	29.7	30.7	30.8	29.7
עיניים	58.4	60.8	57.6	58.0	59.3	59.9	60.8	61.4
אף-אוזן-גרון								
וכירורגיה ראש וצוואר	11.9	13.0	14.5	14.6	15.9	16.5	16.7	17.6
פה ולסת	11.6	10.9	11.4	13.2	13.6	14.5	15.3	15.9
נשים	3.9	3.2	3.9	4.3	4.3	4.0	4.2	4.5
השהיה	36.2	34.4	32.1	31.7	33.3	32.6	33.4	33.6

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.26: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2020

אחוזים

מחלקה	סה"כ	גברים	נשים
כלל המחלקות הכלליות*	100.0	100.0	100.0
פנימית	40.8	39.9	41.9
ריאות	0.3	0.3	0.3
גריאטריה חריפה	3.4	2.8	4.1
נירולוגיה	2.7	2.9	2.6
אונקולוגיה	1.9	2.2	1.7
עור ומין	0.5	0.5	0.5
השתלת מוח עצם	0.1	0.1	0.0
טיפול נמרץ כללי	2.2	2.4	1.9
טיפול נמרץ לב	4.0	4.9	3.1
טיפול נמרץ נשימתי	0.2	0.3	0.2
קורונה	2.6	2.7	2.6
טיפול נמרץ קורונה	0.3	0.4	0.2
כירורגיה כללית	15.4	15.5	15.3
אורתופדיה	6.2	4.6	7.9
אורולוגיה	4.1	6.4	1.7
נירוכיירורגיה	1.3	1.3	1.2
כירורגיה חזה ולב	1.6	1.9	1.3
כירורגיה כלי דם	1.3	1.8	0.8
כירורגיה פלסטית	0.7	0.7	0.7
עיניים	4.0	3.7	4.4
אף-אוזן-גרון וכירורגיה ראש וצוואר	1.1	1.2	1.0
פה ולסת	0.1	0.1	0.1
נשים	1.1	0.0	2.2
השהיה	3.9	3.4	4.4

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.27: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2020

ימים

מחלקה	בני 65+			כלל האוכלוסייה		
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים
כלל המחלקות הכלליות*	5.0	5.0	5.1	3.8	4.0	3.6
פנימית	4.9	4.9	4.9	4.5	4.4	4.5
ריאות	4.4	4.5	4.3	4.4	4.6	4.2
גריאטריה חריפה	10.5	10.1	10.7	10.6	10.1	11.0
נירולוגיה	5.6	5.6	5.6	4.9	5.0	4.7
אונקולוגיה	5.8	5.6	6.0	5.5	5.3	5.6
עור ומין	7.2	6.5	8.0	6.6	6.5	6.8
השתלת מוח עצם	18.8	20.2	16.3	19.0	18.7	19.7
טיפול נמרץ כללי	6.3	6.5	6.1	5.8	5.9	5.5
טיפול נמרץ לב	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	2.8
טיפול נמרץ נשימתי	4.9	4.8	5.0	4.3	4.5	4.2
קורונה	8.0	7.6	8.5	6.3	6.3	6.3
טיפול נמרץ קורונה	11.5	12.3	10.1	11.4	12.4	9.6
כירורגיה כללית	3.4	3.3	3.4	2.3	2.4	2.3
אורתופדיה	5.7	5.9	5.5	4.2	4.0	4.4
אורולוגיה	3.4	3.4	3.4	2.9	2.8	2.9
נירוכירורגיה	6.0	6.1	5.8	5.7	5.9	5.4
כירורגיה חזה ולב	6.1	6.2	5.9	6.1	6.2	5.8
כירורגיה כלי דם	4.7	4.6	4.8	4.4	4.5	4.2
כירורגיה פלסטית	3.9	3.8	4.0	3.9	4.6	3.5
עיניים	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.1
אף-אוזן-גרון						
וכירורגיה ראש וצוואר	3.6	3.7	3.5	2.6	2.5	2.6
פה ולסת	3.8	3.8	3.8	3.4	3.5	3.3
נשים	3.0	0.0	3.0	1.9	1.9	1.9
השהיה	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.28: ביקורים* של בני 65+ וכלל האוכלוסייה במרפאות בתי החולים לקבלת טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי, 2020

סוף שנה

סה"כ	
מספרים מוחלטים	
מטופלים בני 65+	107,492
מטופלים בכלל האוכלוסייה	1,135,214
אחוזים	
ביקורים של בני 65+ מכלל הביקורים	9.5
שיעורים לאלף נפש	
בני 65+	95.3
כלל האוכלוסייה	122.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה
 * ביקורים במרפאה או ביחידה לטיפול יום. במהלך הביקור מטופלים יכולים לקבל יותר ממגע טיפול אחד על ידי מטפלים במקצועות שונים, אך נספר ביקור אחד

לוח 2.29: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2020

מספרים מוחלטים, סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
בני 65+	1	1	0
בני 65-74	1	1	0
בני 75-84	0	0	0
בני 85+	0	0	0
כלל האוכלוסייה	76	44	32

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.30: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מלא, לפי גיל ומין, 2020

סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
כלל בני 65+	273	154	119
בני 65-74	215	130	85
בני 75-84	50	23	27
בני 85+	8	1	7
כלל האוכלוסייה	3,131	2,102	1,029
שיעורים לאלף נפש באוכלוסייה המתאימה			
כלל בני 65+	0.2	0.3	0.2
בני 65-74	0.3	0.4	0.2
בני 75-84	0.2	0.2	0.1
בני 85+	0.1	0.0	0.1
כלל האוכלוסייה	0.3	0.5	0.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.31: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

שיעורים לאלף נפש, סוף שנה

מאפיינים	1990	2000	2009	2015	2019	2020
כלל בני 65+						
סה"כ	3.5	1.5	0.4	0.4	0.3	0.2
גברים	3.1	1.4	0.4	0.4	0.3	0.3
נשים	3.9	1.5	0.3	0.3	0.2	0.2
בני 65-74						
סה"כ	3.6	1.7	0.5	0.5	0.4	0.3
גברים	3.7	1.7	0.5	0.6	0.4	0.4
נשים	3.5	1.6	0.5	0.4	0.3	0.2
בני 75-84						
סה"כ	3.6	1.3	0.3	0.2	0.2	0.2
גברים	2.3	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2
נשים	4.5	1.5	0.3	0.3	0.1	0.1
בני 85+						
סה"כ	3.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
גברים	1.8	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0
נשים	4.0	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1
כלל האוכלוסייה						
סה"כ	1.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3
גברים	2.1	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5
נשים	1.5	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.32: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

מאפיינים	1990	2000	2010	2015	2019	2020
כלל בני 65+						
סה"כ	1,412	1,867	1,645	1,949	2,042	1,641
גברים	526	641	758	913	915	789
נשים	886	1,226	887	1,036	1,127	852
בני 65-74						
סה"כ	892	1,117	1,005	1,287	1,459	1,214
גברים	321	408	497	636	682	593
נשים	571	709	508	651	777	621
בני 75-84						
סה"כ	467	621	540	539	503	367
גברים	181	186	214	221	203	161
נשים	286	435	326	318	300	206
בני 85+						
סה"כ	53	129	100	123	80	60
גברים	24	47	47	56	30	35
נשים	29	82	53	67	50	25
כלל האוכלוסייה						
סה"כ	12,262	18,172	20,918	22,515	23,973	22,193
גברים	6,788	10,632	13,095	13,999	14,787	13,550
נשים	5,474	7,540	7,823	8,516	9,186	8,643

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.33: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2020

אבחנה	בני 65+	בני 74-65	בני 84-75	בני 85+	כלל האוכלוסייה
מספרים מוחלטים					
סה"כ קבלות	1,641	1,214	367	60	22,193
סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות	666	554	104	8	10,354
הפרעות פסיכוטיות חריפות	81	59	17	5	2,150
הפרעות אפקטיביות	610	435	159	16	3,978
הפרעות אורגניות	122	46	53	23	417
הפרעות נירוטיות	88	62	22	4	1,852
הפרעות אישיות	11	8	3		875
הפרעות בגיל הילדות	1	1			375
סמים ואלכוהול	5	5			753
פיגור שכלי	0				57
הסתכלות	55	43	8	4	1,299
לא ידוע	2	1	1		83
אחוזים					
סה"כ קבלות	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות	40.6	45.6	28.3	13.3	46.7
הפרעות פסיכוטיות חריפות	4.9	4.9	4.6	8.3	9.7
הפרעות אפקטיביות	37.2	35.8	43.3	26.7	17.9
הפרעות אורגניות	7.4	3.8	14.4	38.3	1.9
הפרעות נירוטיות	5.4	5.1	6.0	6.7	8.3
הפרעות אישיות	0.7	0.7	0.8	0.0	3.9
הפרעות בגיל הילדות	0.1	0.1	0.0	0.0	1.7
סמים ואלכוהול	0.3	0.4	0.0	0.0	3.4
פיגור שכלי	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
הסתכלות	3.4	3.5	2.2	6.7	5.9
לא ידוע	0.1	0.1	0.3	0.0	0.4

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.34: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2020

גיל	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
כלל בני 65+	417	183	234
בני 65-74	253	103	150
בני 75-84	128	61	67
בני 85+	36	19	17
כלל האוכלוסייה	5,341	2,968	2,373
שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה			
כלל בני 65+	0.4	0.4	0.4
בני 65-74	0.4	0.3	0.4
בני 75-84	0.4	0.4	0.4
בני 85+	0.3	0.4	0.2
כלל האוכלוסייה	0.6	0.6	0.5

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.35: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

מאפיינים	בני 65+	בני 74-65	בני 84-75	בני 85+	כלל האוכלוסייה
נובמבר 2010					
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	66.0	62.1	69.3	73.1	52.5
מכבי שירותי בריאות	18.8	21.4	16.7	14.1	24.7
קופת חולים לאומית	7.4	7.6	7.3	6.8	9.2
קופת חולים מאוחדת	7.8	8.9	6.7	6.0	13.6
נובמבר 2015					
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	61.1	57.8	63.4	70.2	52.3
מכבי שירותי בריאות	22.2	24.4	20.9	16.2	25.2
קופת חולים לאומית	7.4	7.5	7.4	6.8	8.7
קופת חולים מאוחדת	9.3	10.4	8.3	6.8	13.8
נובמבר 2019					
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	58.5	55.6	60.5	68.0	51.7
מכבי שירותי בריאות	24.4	26.2	23.3	18.2	26.5
קופת חולים לאומית	7.2	7.4	6.9	6.6	8.0
קופת חולים מאוחדת	9.9	10.8	9.3	7.3	13.8
נובמבר 2020					
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	57.9	55.1	59.8	67.1	51.6
מכבי שירותי בריאות	24.9	26.6	23.9	18.9	26.8
קופת חולים לאומית	7.1	7.4	6.8	6.5	7.8
קופת חולים מאוחדת	10.1	10.9	9.5	7.5	13.8

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.36: בני 65+ מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות
אחוזים

מועד	סה"כ	שירותי בריאות כללית	מכבי שירותי בריאות	קופת חולים לאומית	קופת חולים מאוחדת
דצמבר 1994	10.2	13.1	4.9	7.2	4.1
דצמבר 1995	10.1	12.9	5.1	7.4	4.4
נובמבר 1996	10.0	13.0	5.2	7.3	4.4
נובמבר 1997	10.1	13.2	5.4	7.2	4.4
נובמבר 1998	10.0	13.2	5.5	7.4	4.6
נובמבר 1999	10.0	13.1	5.6	7.4	4.7
נובמבר 2000	10.0	13.1	5.8	7.5	4.8
נובמבר 2001	10.0	13.1	6.0	7.5	5.0
נובמבר 2002	10.1	13.1	6.3	7.7	5.2
נובמבר 2003	10.2	13.2	6.6	7.9	5.3
נובמבר 2004	10.2	13.2	6.8	8.0	5.4
נובמבר 2005	10.2	13.1	7.0	7.9	5.5
נובמבר 2006	10.4	13.2	7.3	8.0	5.8
נובמבר 2007	10.1	12.9	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2008	10.1	12.8	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2009	10.1	12.8	7.5	8.1	5.6
נובמבר 2010	10.2	12.8	7.7	8.2	5.8
נובמבר 2011	10.0	12.6	7.6	8.2	5.8
נובמבר 2012	10.7	13.0	8.7	8.7	6.7
נובמבר 2013	10.9	13.1	9.2	9.1	7.0
נובמבר 2014	11.1	13.1	9.7	9.2	7.3
נובמבר 2015	11.4	13.3	10.1	9.6	7.7
נובמבר 2016	11.7	13.5	10.5	10.1	8.0
נובמבר 2017	11.9	13.7	10.8	10.4	8.3
נובמבר 2018	12.1	13.8	11.1	10.6	8.6
נובמבר 2019	12.3	13.9	11.4	11.0	8.9
נובמבר 2020	12.5	14.0	11.6	11.4	9.2

מקור: המוסד לביטוח לאומי