

# פגיעות מיניות ביחסי מטפל-מטופל במערכת הבריאות בישראל – ממדי התופעה ומאפייניה

נספח: הבדלים בין קבוצות – ממצאים מניתוח דו-משתני ורב-משתני

שרביט פיאלקו, רחל ניסנהולץ-גנות, תמי ברוש, ברוך רוזן  
המחקר נערך בהזמנת משרד הבריאות ומומן בסיועו



# מטרות ושיטה

במצגת זו מובא נספח לדוח: פגיעות מיניות ביחסי מטפל-מטופל במערכת הבריאות בישראל – ממדי התופעה ומאפייניה. המצגת מציגה ניתוח נוסף של נתוני סקר הפאנל האינטרנטי שנערך במסגרת המחקר. לממצאים המלאים ושיטת המחקר

## לחצו כאן

### ■ מטרות הנספח:

- לזהות קבוצות באוכלוסייה שנמצאות בסיכון גבוה להיפגע מינית על ידי גורם מטפל במערכת הבריאות
- לאפיין את סיכוייהן של נשים מקבוצות שונות באוכלוסייה (כלומר, בעלות מאפייני רקע שונים) שנפגעו במערכת הבריאות לפנות לקבלת סיוע, לדווח או להגיש תלונה בעקבות הפגיעה

### ■ שיטה:

כל שאלות הסקר נבדקו לצורך מציאת הבדלים בשיעורי המשיבות לפי מאפייני רקע – גיל, קבוצת אוכלוסייה (יהודיות ואחרות, ערביות), השכלה, מצב משפחתי, ארץ לידה, עבודה במקצועות בריאות, חמישוני הכנסה, מדד חברתי-כלכלי, קופת חולים, מחוז מגורים, מגורים בפריפריה ופגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות. בקבוצות שבהן נמצאו הבדלים בניתוח דו-משתני, הורץ ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, לעומת יתר הקבוצות. במצגת יוצגו ההבדלים שנמצאו ברמת מובהקות של 0.05 לפחות.



# הסקר וקובץ הנתונים



# על הסקר



## שיטת הדגימה

דגימה לפי מכסות קבוצת גיל  
וקבוצת אוכלוסייה (יהודיות  
ואחרות, ערביות)



## מסגרת הדגימה

נשים בוגרות בישראל  
(בנות 21 ויותר) החברות בפאנל  
סקרים אינטרנטי



## אוכלוסייה

נשים בוגרות בישראל  
(בנות 21 ויותר)



## ייצוגיות

הסקר שוקלל כדי להגיע  
לייצוגיות לפי גיל וקבוצת  
אוכלוסייה



## שפה

עברית וערבית



## מספר משיבות

מדגם ברוטו 1,064  
מדגם נטו 963



## שיטה

סקר אינטרנטי  
(ינואר עד יוני 2023)



# מאפיינים חברתיים-כלכליים (N=963)

## השכלה

61% אקדמאיות  
39% לא אקדמאיות

## חרדיות

2%

## קבוצת אוכלוסייה

ערביות | יהודיות ואחרות  
18% | 82%

## פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות

39%

## אזור

11% ירושלים ויהודה ושומרון  
17% צפון  
18% חיפה  
29% מרכז  
16% תל אביב  
10% דרום

## הכנסה

20% חמישון תחתון  
72% חמישונים 2-4  
8% חמישון עליון

## גיל

טווח 70-21  
ממוצע 45

29% 34-21  
20% 44-35  
17% 54-45  
34% +55




## הגדרות

- "מטפל" – איש צוות רפואי או פרה-רפואי בעל רישיון העוסק באחד מהמקצועות שלהלן במערכת הבריאות הציבורית והפרטית: רופא וסטז'ר בכל התחומים (כולל רפואת שיניים), אח, פסיכולוג, עובד סוציאלי, קרימינולוג קליני, אופטומטריסט, אורתופטיקאי, יועץ בתחום הגנטיקה, דיאטן, מהפנט, עובד מעבדה, רוקח ועוזר רוקח, פודיאטר, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, טכנאי רפואי, שינן, וכן כל איש מקצוע ממקצועות בריאות טיפוליים שהוכר כמטפל לפי חוק זכויות החולה או בתקנות שונות. מטפל בהקשר לעבודה זו מתייחס לשני המינים
- "מטופל" – אדם המבקש או מקבל טיפול, בדיקה או ייעוץ רפואיים ופרה-רפואיים. מטופל בהקשר לעבודה זו מתייחס לשני המינים
- "פגיעה מינית" – עבירות מין, ניצול והטרדות מיניות: מבט מבזה מבחינה מינית או הצצה, אמירות בעלות אופי מיני או על רקע נטייה מינית, התנהגות מינית לא הולמת (התפשטות, התנשפות) וביצוע מעשים מגונים בעצמם, הצעות בעלות אופי מיני, מגע בעל אופי מיני, בקשה להתפשט באופן שגרם לחוסר נוחות או באופן שחורג מהנחוץ לטיפול, סחיטה או איומים (כולל שימוש בכוח פיזי) על רקע מיני, ניסיון לאונס, אונס או מעשה סדום. אומדן התופעה שיימדד בעבודה זו הוא על פני כל תקופת החיים
- נפגעות מחוץ למערכת הבריאות – מי שדיווחה שנפגעה בעבר על ידי גורם שאינו מטפל במערכת הבריאות (לרבות מקרים של הטרדה מינית)



# שיעורי נפגעות (אי פעם) על ידי גורם מטפל במערכת הבריאות

# שיעורי נפגעות במערכת הבריאות (בכל סוג של פגיעה) בקרוב קבוצות שונות, באחוזים



\* $p < .05$

\*\* $p < .01$


## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.092	(0.93-2.55)	1.54	מדד חברתי-כלכלי בינוני או גבוה
0.020	(1.1-3.18)	1.87	מחוז ירושלים ויו"ש (לעומת תל אביב, דרום, חיפה וצפון)
0.046	(1.01-1.95)	1.40	מחוז מרכז (לעומת תל אביב, דרום, חיפה וצפון)
0.589	(0.7-1.87)	1.15	יהודיות ואחרות
<0.001	(3.38-6.08)	4.53	פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות
<0.001			Constant





# שיעורי נפגעות (מבטים) בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה, באחוזים




\* $p < .05$

\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.034	(1.04-2.7)	1.68	יהודיות ואחרות
0.027	(1.08-3.71)	2.00	בנות 64-21
<0.001	(3.15-6.09)	4.38	פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות
<0.001		0.07	Constant

# שיעורי נפגעות (אמירות) בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה, באחוזים




\* $p < .05$

\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.015	(1.13-3.1)	1.87	יהודיות ואחרות
0.001	(1.59-6.85)	3.30	בנות 64-21
<0.001	(2.86-5.63)	4.01	פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות
<0.001		0.03	Constant

# שיעורי נפגעות (בקשה להתפשט) בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה, באחוזים




\* $p < .05$

\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.142	(0.79-4.99)	1.99	בנות 21-64
0.017	(1.11-2.87)	1.79	רווקה (לעומת מצב משפחתי אחר)
<0.001	(3.34-8.08)	5.20	פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות
<0.001		0.03	Constant

# שיעורי נפגעות (נגיעות) בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה, באחוזים



\* $p < .05$

\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.016	(1.15-3.73)	2.07	מחוז ירושלים ויו"ש (לעומת תל אביב, דרום, חיפה וצפון)
0.016	(1.11-2.73)	1.74	מחוז מרכז (לעומת תל אביב, דרום, חיפה וצפון)
0.667	(0.61-2.15)	1.15	יהודיות ואחרות
<0.001	(2.11-4.85)	3.20	פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות
<0.001			Constant



# שיעורי נפגעות (מעשה מגונה בפנייך) בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה, באחוזים




\* $p < .05$

\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.030	(1.08-4.57)	2.22	חמישון תחתון
<0.001	(2.07-8.83)	4.28	פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות
<0.001		0.02	Constant

## שיעורי נפגעות (הצעות מיניות) בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה, באחוזים



\* $p < .05$

\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.064	(0.97-2.57)	1.58	בנות +55
0.009	(1.18-3.09)	1.91	לא אקדמאיות
<0.001	(2.74-7.64)	4.58	פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות
<0.001		0.03	Constant

# שיעורי נפגעות (סחיטה ואיומים) בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה, באחוזים




\* $p < .05$

\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.201	(0.74-4.12)	1.75	יישוב פריפריאלי
0.052	(0.99-11.71)	3.40	מבוטחת לאומית (לעומת כללית ומאוחדת)
0.194	(0.16-1.45)	0.48	מבוטחת מכבי (לעומת כללית ומאוחדת)
<b>0.008</b>	<b>(1.32-6.45)</b>	<b>2.91</b>	<b>חמישון תחתון</b>
0.196	(0.72-4.82)	1.87	ערביות
0.997	(0-0)	0.00	בנות +65
<b>&lt;0.001</b>	<b>(2.43-13.81)</b>	<b>5.80</b>	<b>פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות</b>
<0.001		0.01	Constant

# שיעורי נפגעות (אונס או ביצוע מעשים מיניים בכפייה) בקרוב קבוצות שונות באוכלוסייה, באחוזים



\* $p < .05$


\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.040	(1.03-4.26)	2.10	חמישון תחתון
0.274	(0.71-3.38)	1.55	גרופה או חיה בנפרד (לעומת מצב משפחתי אחר)
<0.001	(6.22-47.3)	17.15	פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות
<0.001		0.01	Constant



# פגיעה מתמשכת (יותר מפעם אחת) מאותו מטפל בקרב נשים שנפגעו, באחוזים



\* $p < .05$   
 \*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.065	(0.96-4.57)	2.09	ערביות
<b>0.006</b>	<b>(1.31-5.01)</b>	<b>2.56</b>	<b>פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות</b>
<0.001		0.10	Constant




**פנייה לקבלת סיוע,  
דיווח והגשת תלונה  
בעקבות פגיעה**



# שיעורי פנייה לגורם כלשהו לסיוע<sup>א</sup> בקרב נשים שנפגעו, באחוזים

<sup>א</sup>פנייה לצורך קבלת סיוע בעקבות הפגיעה אינה כוללת פנייה לגורם רשמי לצורך דיווח והגשת תלונה



\* $p < .05$


\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.003	(1.39-4.68)	2.55	בנות 34-21
0.008	(1.28-5.28)	2.60	פגיעה מינית מחוץ למערכת הבריאות
<0.001		0.07	Constant



## שיעורי דיווח והגשת תלונה לגורם רשמי כלשהו בקרב נשים שנפגעו, באחוזים



\* $p < .05$

\*\* $p < .01$

## ממצאים מניתוח רב-משתני

Sig.	95% C.I. for EXP(B)	Exp(B)	
0.058	(0.97-8.57)	2.88	ערביות
<b>&lt;0.001</b>	<b>(3.43-20.21)</b>	<b>8.32</b>	<b>פנתה לגורם כלשהו לקבלת סיוע</b>
<0.001		0.03	Constant



# סיכום

**נשים עם מאפייני רקע שונים נמצאות בסיכון שונה להיפגע על ידי גורם מטפל במערכת הבריאות:**

- **נשים שעברו פגיעה מינית (מכל סוג שהוא) מחוץ למערכת הבריאות נמצאות בסיכון גבוה להיפגע מינית גם על ידי גורם מטפל בתוך מערכת הבריאות.** נשים אלו גם בסיכון לכך שהפגיעה תהיה פגיעה מתמשכת. הסיכוי שנשים אלו יפנו לגורם כלשהו לקבלת סיוע גבוה מהסיכוי של נשים שלא נפגעו מינית מחוץ למערכת הבריאות.
- **לנשים יהודיות ואחרות** סיכוי גבוה יותר מהסיכוי של נשים ערביות להיפגע ממבטים ומאמירות, אך לא מסוגי פגיעות מיניות אחרות.
- **באופן דומה, לנשים צעירות (מתחת לגיל 65) סיכוי גבוה יותר מהסיכוי של נשים בנות 65+** להיפגע ממבטים ומאמירות, אך לא מסוגי פגיעות מיניות אחרות. נשים בנות 21-34 נוטות לפנות לגורם כלשהו לקבלת סיוע, בשיעור גבוה יותר מנשים בנות 35+.
- **נשים המשתייכות לחמישון התחתון** נמצאות בסיכון גבוה יותר להיפגע מהמעשים החמורים ביותר – מעשים מגונים, סחיטה ואיומים, אונס או ביצוע מעשים מיניים בכפייה, לעומת נשים המשתייכות לחמישון הכנסה גבוהים יותר.
- **לנפגעות שפונות לקבלת סיוע בעקבות הפגיעה** סיכוי גבוה יותר לפנות לגורם רשמי לצורך דיווח על הפגיעה והגשת תלונה